

GESCHRIJVING

113

DER

# VRUCHTSOORTEN.

UITGEGEVEN DOOR DE

„Vereeniging tot Regeling en Verbetering der Vruchtsoorten.”

TE BOSKOOP.

Eerste Reeks. — 1862.



TER DRUKKERIJ VAN  
G. B. VAN GOOR, te GOUDA.

## EEN WOORD VOORAF.

*De buitengewone vermeerdering van Vruchtsoorten, in de laatste Jaren, voornamelijk door invoering uit het Buitenland ontstaan, heeft hier te lande, gelijk elders, veel verwarring veroorzaakt, waartoe plaatselijke benamingen, op verschillende wijze, het hare bijgedragen hebben.*

*Geroelde men in Duitschland, België, Engeland en Frankrijk, enz. behoefte aan Vereenigingen van Pomologen, tot samenwerking om uit de verwarring te geraken, welke Vereenigingen ook tot stand kwamen; ook hier ter plaats waar men zich, reeds langer dan eene eeuw op de Vruchtboomen-kweekerij had toe geleyd (ofschoon het kweeken van andere Boomen en Planten ook eene voorname plaats in onze kweekerijen inneemt), deed de behoefte, om eene zoodanige Vereeniging in 't leven te roepen, zich mede gevoelen, tot dat ze in het laatst van het jaar 1860 werd opgericht onder den naam van: »Vereeniging tot Regeling en Verbetering der Vruchtsoorten.»*

*Als een eerste voortbrengsel van hare werkzaamheden tot bereiking van het voorgestelde doel, geeft de »Vereeniging» de volgende beschrijving van een 100tal Appelsoorten, en 90 Peersoorten in het licht.*

*Daar de samenstellers geene Geleerden zijn in den gewonen zin van dit woord, maar veelmeer practisch gerormde kweekers, zoo verwachtte men ook geene systematische beschrijvingen; daartoe ontbrak het ons eenendeels aan de noodige kennis, anderdeels komt dit ons voor als zeer omstigtig, en toch minder bevorderlijk aan het doel; ook nog, omdat men in het Buitenland daarmede nog niet tot eenheid konde komen; elk geleerde heeft daar zijn eigen stelsel!*

*Bij onzen arbeid hebben wij gebruik gemaakt ter vergelijking: 1) van het bekende oude Pomologische Werk van KNOOP, in de tweede kolom meestal, waar wij overeenstemming vonden, aangegeven, met opgaaf der Plaat, waarop de vrucht is afgebeeld tab. —. 2) Van het Plaatwerk van den Heer MATTHIEU VAN NOORDT, welke zich, op ZEd, buitengoed te Voorschoten bij Leiden, van het jaar 1850 af tot 1840 toe, van tijd tot tijd*

onledig hield met de afteekening en beschrijving van ruim 80 Appel- en Perensoorten, hier te lande meestal nog bekend.

Van buitenlandsche werken gebruikten wij: 1) het *Illustrirtes Handbuch der Obstkunde* uitgegeven te Stüttgart, door verschillende *Duitsche Pomologen*, (door H. B. fol. — bij onze beschrijving aangeduid). 2) *Van de Catalogue of the Fruits*, met Supplement, te Londen uitgegeven (met C. L. n<sup>o</sup>. —). 3) van het *Journal de la Société Imperiale etc.* n<sup>o</sup>. Mars 1860 (door *Journal de Lyon*) en 4 van de *Annales de Pomologie* (7 deelen, voor als nog) te Brussel uitgegeven (door *Annales de Pom.* Jaar — fol. — aangeduid).

Waar wij, bij het onderzoek in genoemde *Pomologische Boekwerken*, verwarring in de Soorten of Namen hebben aangetroffen, waarvan wij zekerheid hadden, is dit bij de beschreven soorten vermeld geworden; waar wij niet zeker van de gelijkheid waren, hebben wij dit door „vermoedelijk” aangeduid; waar wij eindelijk gelijkkluidende namen hebben gevonden, maar afwijking in de afteekening of beschrijving der soort, is dit mede door ons aangeeteekend, of hebben wij ook wel gezweigen; b. v. in de *Annales de Pom.* vonden wij de *Reinette* Fransche graauwe „*Reinette gris de France*”, waarvan de afbeelding wel met onze soort overeenstemt, maar de beschrijving van den boom en het gewas zoo afwijkt, dat daár waarschijnlijk de *Reinette* dubb. zure graauwe is bedoeld geworden.

Wat de Namen betreft, doorgaans hebben wij ons aan de hier meest gebruikelijke gehouden, zonder vertalingen, noch van de Nederlandsche in andere talen, noch omgekeerd; wij dachten, met te vertalen niet tot meerdere duidelijkheid te kunnen geraken, ofschoon het uitspreken van uitheemsche woorden zeker moijelijkheden oplevert voor ongeoeffenden. Om echter niet bespottelijk te worden, hebben wij ons dit anti-nationale moeten laten welgevallen, en verwachten dit ook van de Vruchten-liefhebbers; wat zou men toch gewonnen hebben, om b. v. van de Appelen den naam „*Court pendu*” door Kortsteel of Korthanger, van de Peren den naam „*Arbre Courbé*” door krom- of kromme Boom, over te zetten; en zoo zoude meerdere voorbeelden, aan te halen zijn.

Ter verduidelijking hebben wij gemeend, bij het aangeven van den vorm, eene Vormtafel voor Appelen, en eene voor Peren aan te moeten nemen; immers, hoe zal men tot een regt denkbeeld kunnen komen bij enkele beschrijving? daar de oningewijde onmogelijk kan verstaan, wat bedoeld wordt, als men b. v. zou schrijven „spits-rond” of „stompkegelvormig”, enz. Men moet echter waarschuwen voor een al te streng hechten aan deze vormen, daar de spelling in de natuur zonder eind is, en er voorbeelden bestaan, dat men van ééne boom vruchten kan oogsten, waarvan, streng toezien, naauwelijks ééne vrucht naar de andere gelijk; b. v. van de *Peer Beurré d'Aren-*

*berg*; ook hebben wij ons bij de meeste soorten niet geheel aan den genoemden vorm kunnen houden, maar hier en daar toelichtende beschrijvingen moeten maken van meer of minder „ingebogen”, „afgerond” enz., welk men wel in acht dient te nemen bij het onderzoek.

Om de grootte te bepalen, hebben sommigen in het buitenland de maat opgegeven, van hoogte en breedte of dikte, dit is evenzeer moijelijk: moet men van de grootste of kleinste vruchten, van eenen boom geplukt, de maat nemen? Wij hebben geoordeeld normaalvormen op te moeten geven, als volgt:

- Voor Appelen van de 1ste grootte b. v. de Keizer Alexander;
- 2de „ *Reinette van Zorgvliet* en witte *Winter-Calville*;
- 3de „ *Wijker Pippeling* en *Princesse-Noble*;
- 4de „ dubb. *Goud Pippeling* en kleiner.

Zoodat men b. v. bij de *Astrachaner roode*, 5de grootte, denken moet aan eenen Appel, ongeveer zoo groot als een *Wijker Pippeling* of *Princesse Noble*, in anderen vorm).

Voor de Peren 1ste grootte b. v. de lange en ronde *Gratiool* en *Duchesse d'Angoulême*.

- 2de „ *Beurré Diel* (*Meloenpeer* en *Vijgepeer*).
- 3de „ *Beurré blanc* en *Poire Madame*.
- 4de „ *Bergamotte* of *Sappige Groentje* en *Jullepeer* en kleiner.

Zoodat men b. v. bij de *Peer „Arbre Courbé”* te denken heeft, aan eene vrucht zoo groot als de *Beurré Diel*, of de *Vijgepeer*, (hoewel anders gevormd).

Bij de beschrijving der kleur, die de vrucht uitwendig heeft, houde men in het oog, dat, en in ons klimaat, en op onze veenachtige gronden, deze meestal minder lewendig, en meer met graauw (roest) is voorzien, als in warmere luchtstreken, en op klei- of zandgronden; indien men zich ook daar te veel aan hechte, kwam men zeker niet tot een goed einde.

De tijd van gebruik is door de samenstellers middelbaar opgegeven. Veel hangt af van gunstige zomers, standplaats, enz.; ook zijn er voorbeelden, dat er groote afwijkingen plaats hebben, b. v. de *Peer „Beurré Bretonneau”* van *Pyramiden* heeft men in November, en dezelfde soort van *Leiboom* voor eenen maer geplukt, in Maart kunnen gebruiken; ook is het bekend dat men sommige vruchten, goed bestoten bewaard, veel langer houden kan, dan hare eigenschap gewoonlijk medebrengt.

De letters K 1 beteekenen dat de soort voor de keuken of huishouding van een eersten rang, K 2 dat zij van minder rang is; even zoo T 1, dat dezelve voor de tafel of om uit de hand raauw te gebruiken, eene eerste, T 2 en T 3, dat zij van den tweeden of derden rang (voor dit doel geschikt) is.

Bij de bepaling voor den Boomvorm dient nog opgemerkt te worden, dat vele soorten voor alle vormen gebruikt kunnen worden. Evenwel raden

wij, dat men voor sijne Winter-Tafelperen, meest den leivorm kiezen zal; dat voor sijne late Herfst-Tafelperen, de pyramide- en dwergvorm meer geschikt is; dat voor groote vruchten, waarvoor men hoogstammen kiest, eene beschutte standplaats zeer ten goede komt.

In België en Frankrijk kiest men den leivorm meest voor vroege vruchtsoorten, om ze nog vroeger te hebben; en voor late wintervruchtsoorten om ze tot behoorlijke rijpheid te brengen.

Men zou kunnen vragen, waarom wij ons tot dit getal soorten beperkt hebben; waarom wij nog geene Kersen, Pruimen, Abrikozen, Perziken en Druiven hebben beschreven? — Hierop antwoorden wij: dat wij het getal alzoo beperkt hebben, omdat men geene soorten wilde beschrijven, waarvan slechts oppervlakkige kennis bestond; dat, waar men nog beschrijving zou hebben kunnen geven, b. v. van de Peren, Marie Louise, de Calebasse Bosc, enz., de verwarring zoo groot is, dat, zonder nadere kennismaking met de verschillende dezer naamdragende soorten, men niet tot zekerheid kan komen; dat van Kersen, Pruimen, Abrikozen, Perziken en Druiven, van vele soorten nog geene genoegzame proeven zijn genomen, om iets met zekerheid te boek te stellen. 't welk slechts door onderlinge vergelijking van de soorten, welke in het bezit zijn der verschillende kweekers, kan geschieden.

Wij hopen dus ons Werk later voort te zetten.

Onzen eersten arbeid dragen wij den beminnaars van vruchten nederig op; gegronde aanmerkingen, en terechtwijzingen zullen ons altijd welkom zijn: wij wenschen daarvan een dankbaar gebruik te maken.

Ten slotte: indien men hiernede eenigzins beorderlijk kon zijn, om uit de bestaande grenzeloze verwarring van namen en soorten te geraken; om de minkundigen in het doen eener goede keuze behulpzaam te zijn, en bijdragen mogt tot den bloei van de Vruchtboomkweeking in ons Vaderland, maar vooral ook in onze Gemeente, — de Zamenstellers van dit Werk en het Bestuur der „Vereeniging” zouden hunne moeite rijkelijk beloond achten.

Het BESTUUR der „Vereeniging tot Regeling en Verbetering der Vruchtsoorten.”

Boskoop, JANUARIJ 1863.

Aan de Leden onzer VEREENIGING wordt berigt, dat de Nos voor de beschrevene soorten, geplaatst, niet verward moeten worden met de Nummers van de soorten door de Vereeniging verspreid en afgegeven: dewijl daar eene andere volgorde is gehouden.

1.

# APPELSOORTEN

EERSTE GEDEELTE.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
1. <b>Astrachaner, Roode.</b> Rother Astrakan. Astrachan red.	H. B. 79. C. L. 17.	Fig. 5.	3.	donker rood, zonzijde iets bruinachtig rood, hier en daar groene stippen.	August. Septemb.	2 T.	Hoogst. en Pyr.	Zeer vruchtbaar.
2. <b>Astrachaner, Witte.</b> Jacobia appel. Weiszer Astrakan. Mela d'Astrakan. White Astrachan.	Württemberg. H. B. 87. Italië. C. L. 48.	Fig. 5, naar den kelk iets spits dan de roode.	5.	geelachtig wit, met ligte roode vlammen aan de zonzijde.	August.	2 T.	Hoogst. en Pyr.	Zeer vruchtbaar niet te verwarren met de Glasappel.
3. <b>Aagt blanke,</b> Tulp-Aagt.	M. v. Noordt.	Fig. 5, naar den kelk somtijds meer gespist.	4.	groenachtig geel, met veel karmozijnroode streepen, vlammen en vlekjes.	Decemb. Febr.	1 T.	Hoogst. en Pyr.	Zeer vruchtbaar, vermoedelijk dezelfde met -Doppette Agatapfel. H. B. 243.
4. <b>Aagt Enkhuizer,</b> Zure Wildjes Appel. Trijn Weeuwster.	M. v. Noordt. Knoop tab. 12.	Fig. 7, ook wel fig. 8.	5.	ligt geel met veel fraai karmozijnrood overtogen, aan de steelholte weinig roest.	Decemb. Maart.	5 T. 1 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar.
5. <b>Aagt roode,</b> Purperrother Winter Agathapfel. Purperrother Agathapfel. Purperrother Kronenapfel. Roode Tulpkroon. Engelsche Aagt.	Knoop tab. 7. H. B. 457. C. L. N° 1.	Fig. 5, eenigzins spits afgerond naar den kelk.	4.	geelachtig, bijna geheel met donkerrood overtogen, waarin donker bruin roode streepen en vlammen.	Decemb. Febr.	1 T.	Alle vormen.	Vruchtbaar.
6. <b>Aagt zomer,</b> Blanke Tulpappel. Tarw appel. Zijden Hemdje. Oogstappel. Augustus appel. Pijp appel. Augustapfel.	in 't Westland. M. v. Noordt. M. v. Noordt. in somm. strek. Denemarken.	Fig. 8, wel wat ver- anderlijk.	5.	troogeel, aan de zonzijde met ligt rood overtogen, geheel overdekt als met dauw.	August.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Draagt spoedig en mild.
7. <b>Borovitsky.</b>	C. L. N° 74. Anales de Pom. 7. pag. 49.	Fig. 5, ook wel iets platter.	5.	troogeel, met karmozijn gevlamd en gestreept.	August.	1 T.	Hoogst. en Pyr.	Draagt mild, is zeer fraai.
8. <b>Bellefleur, Brabandsche.</b> Keulemans appel. Strieping (in Vlaanderen).  Bon-Pommier (Limburg in België). Winter Bellefleur (Antwerpen).	Knoop tab. 8. C. L. 45. Anales de Pom 2 p. 47.	Fig. 6, doch zeer ver- anderlijk, rondom den kelk met klei- ne ribben.	5.	geel, met veel rood, purperachtig gevlamd en gestreept.	Febr. Mei.	2 T. 1 K.	Hoogst.	Voor de Boomgaard aan te bevelen, in het H. B. Pag 183. niet echt
9. <b>Bellefleur, Hollandsche.</b> Spaansch Zuur.		Fig. 7, naarden kelk meer afgerond, en met kleine ribben.	2.	troogeel met veel rood overtogen, (aan de zonzijde,) waarin donkerder streepen en vlammen.	October. Novemb.	2 K.	Hoogst.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTT.
10. Bellefleur, Westlandsche. Tulpappel. Tulpers.	Omstr. v. Haarl. Westland.	Fig. 5, naar den kelk eenige matige rib- ben.	3.
11. Bellefleur, Zoete.		Fig. 6, iets meer afge- ronnd, de kelk met klei- ne ribben omgeven.	3.
12. Blenheim Pippin. GoldreINETTE von Blenheim. Woodstock Pippin. Northwick Pippin. Kemster's Pippin. Blenheim	H. B. 515. C. L. n <sup>o</sup> . 70. Annal. de Pom. 2 pag. 7.	Fig. 5, eenigzins plat gedrukt.	2.
13. Burns Seedling.	C. L. 102.	Fig. 5, iets plat ge- drukt.	2.
14. Borsdorfer. Edler Winter Borsdorfer. Marschansker. Maschansken. King George III. Reinette Batarde.	Knoop tab. 10. H. B. 505. Oostenrijk. Idem. Engeland. Frankrijk.	Fig. 4, ook wel wat platter.	4.
15. Calville, Witte winter. Calville, weisze winter. Eck apfel, Eggerling. Melonen apfel. Calville blanche à Côtes. Rambour à Côtes gros. Pomme de Fraise. White winter Calvill.	Knoop tab. 9. Duitschland. H. B. 55. Zwitserland. Frankrijk. Annal. de Pom. 2-67. C.L. 110.M. v.N.	Fig. 5, over de ge- heele vrucht sterke ribben.	2.
16. Calville, Witte hersft.	Knoop tab. 1. M. v. Noordt.	Fig. 5, naar den kelk een weinig geribd.	5.
17. Calville, Witte zomer. Madeleine blanche. Pomme Neige?	An. d. P. 4-77.	Fig. 7, doch iets kor- ter, naar den kelk, kleine ribben.	4.
18. Calville, Gele winter. Calville Jaune d'hiver.		Fig. 5, naar den kelk sterk geribd.	5.
19. Calville Malingrée.	C. L. en 114. Annal. de Pom. 5-104.	Fig. 7, naar den kelk wat geribd.	5.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEN BOONVORM	OPMERKINGEN
Droevig groenachtig geel met veel rood, waarin vele karmozijn- roode vlammen.	Decemb.	2 K.	Hoogst.	
Ligt geelachtig groen, met karmozijn- rood aan de zonzijde overtogen, waarin eenige donkere vlammen.	Decemb. Febr.	1 K.	Hoogst.	Vermoedelijk dezelfde als H. B. pag. 182.
Groenachtig geel, bij volle rijpheid goud geel, met karmozijn rood aan de zonzijde, waarin vlammen en streepen, hier en daar graauw bruine stippen over de huid.	Novemb. Febr.	1 T.	Voor alle vormen.	Een der schoonste appelen, in den laatst- kend geworden.
Ligt geel, wordt goud geel, met eenige flaauwe roode streepen en vlammen, veel graauwe stippen, onregelmatig verspreid.	October. Januar.	1 T.	Voor alle vormen.	Heeft veel overeen- de Blenheim pippin. echter in den groei c
Glad, witachtig geel, zonzijde met fraai rood overtogen.	Decemb. Febr.	1 T.	Alle vor- men.	In Duitschland zeer
Witachtig geel, zonzijde meer geel, ook zeldzaam iets roodachtigs.	Decemb. April.	1 T.	Pyram. en Leib.	
Groenachtig wit, zelden iets rosé.	Septemb. October.	5 T.	Hoogst.	Meest bekend onder van witte zomer-Calvill.
Groenachtig geel, met iets ligt rood aan de zonzijde.	August.	1 T.	Pyram.	
Stroogeel, zonzijde goudgeel, som- tijds ook iets roods.	Novemb. Januar.	1 T.	Hoogst en Pyr.	H. B. fol. 37. n <sup>o</sup>
Groenachtig met veel droevig rood en geel aan alle kanten overtogen, zon- zijde donkerder roode vlammen en streepen.	Decemb.	2 T.	Hoogst en Pyr.	Zaailing, uit de ter Calvill met den kantappel gekruist.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE.
20. <b>Calville. Roode Winter.</b> Rother Winter Calvil. Rother Himbeer, Rother-Erdbeer apfel. Calville rouge Couronnée. Red Calvill. Normandische roode Calvil.	Knoop Tab. 11. H. B. 45. Duitschland. Frankrijk. C. L. 118. Annal. de Pom. 4—11.	Fig. 5, naar den kelk geribd, ook wel iets hooger.	5.
21. <b>Calville, Roode Herfst.</b> Roode Rammelaar. Geldersch Present. Roode wijnappel. Kroot appel. Edelkönig (Diel) Rother Herbst Calvil. Rother-Beerapfel. Klapper apfel. Calvill rouge d'Automne. Grelot, Sonnette. Pomme violette.	Knoop Tab. 5. M. v. Noordt.  Noordbrabant. Noordholland en aan de Lek. H. B. 41. Coburg.  C. L. Annal. de Pom. 4—95.	Fig. 5, sterk geribd.	2.
22. <b>Calville. Roode Zomer.</b> Rother Sommer Calvil. Madeleine, Rouge Caville. Rouge d'Eté, Pigeon rouge d'Eté. Passé Pomme rouge d'Eté.	Knoop Tab. 1.  C. L. 117.	Fig. 7, naar den kelk 5 of 4. iets geribd.	
25. <b>Couleur de Chair.</b> Jagt appel. Zomerzijden-Hemdje ( <i>verkeerd</i> ). Sommer Zimmt apfel. Rother Herbst Taubenapfel. Edler Rosen Streifling. Roode Strieppjes appel. Pauwtjes appel. Tarwappel.	Overijssel.  H. B. 254.  Deventer. Westland. Brielle, N.Brab.	Fig. 7.	4.
24. <b>Charlemowski.</b> Duchess of Oldenburg.	H. B. 95. C. L. 221. Annal. de Pom 4—81.	Fig. 5.	5.
25. <b>Citroen appel.</b>		Citroenvormig.	5.
26. <b>Codlin, Keswick.</b>	C. L. 158.	Fig. 7, naar den kelk geribd, en iets minder spits.	5.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEEN BOONVORM.	OPMERKINGEN.
Karmozijnrood, zonzijde bruinrood.	October. Decemb.	2 T.	Pyram. en Leib.	
Karmozijnrood, zonzijde bruinrood, vette huid.	Septemb. October.	2 T. 1 K.	Hoogst.	
Karmozijnrood, met purperrood, overdekt als met dauw.	August.	1 T.	Pyram. en Leib.	Groeit slecht, doch draagt spoedig. Zou deze de in H. pag. 89 beschreven "Rother Margarethapfel" zijn kunnen.
Stroogeel, aan alle zijden met veel karmozijnrood, en ligt en rood, gestreept en gevlamd.	Septemb.	4 T.	Hoogst.	Bij Knoop Tab. 1 niet zelfde.
Stroogeel met fraai rood gevlamd.	August. Septemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
Citroengeel.	Septemb.	3 T.	Pyram.	Om den zeldzamen vorm waar- dig te kweeken.
Vuil groenachtig geel, met iets aschgrauw, meestal een graauwe naad over de geheele vrucht, aan eene zijde.	Septemb.	1 K.	Hoogst.	De Collins zijn allen zeer vruchtbaar, voor de huishouding uittmuntend, en voor de markt aanbevelenswaardig.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTTE.
27. <b>Codlin, Manks.</b> Irish Pitcher. Irish Codlin.	C. L. 161.	Fig. 5. Ook wel hooger.	5.
28. <b>Codlin, Spring Grove.</b>	C. L. 166.	Fig. 5, naar den kelk sterk geribd.	5.
29. <b>Court-pendu.</b> Pomme de Bardin. Königlicher Kurzstiel. Corianda Rose. Pomme de Berlin. Garmon's Apple. Wollaton Pippin. Courtpendu rouge. Reinet van Goslinga.	Knoop Tab. 10.  H. B. 167. C. L. 185. Annal. de Pom. 2—25.  naar Knoop.	Fig. 1.	5.
50. <b>Coussinot-Zomer.</b> Coussinotte d'Été. Zomer Kroon. Zomeraagt. Couleur de Chair. Sommer Erdbeer Apfel.	Knoop Tab. 1.  bij Knoop doch verkeerd.	Fig. 5, naar den kelk spits afgerond.	4.
51. <b>Danziger Kant Apfel.</b> Calvillartiger Winter Rosenappel. Bentlebener Rosenapfel. Lorenz Apfel. Florentiner. Rother Liebes Apfel. Schwäbischer Rosen Apfel. Dantziger Kantappel. Dantziker Kantappel.	H. B. 81.     Knoop Tab. 4. M. v. Noordt.	Fig. 5, wat hoog naarden kelk sterk geribd.	5.
52. <b>Devonshire Quarrenden.</b> Red. Quarrenden. Sack Apple. Rother Quarrendon. Morgenroth Apfel.	C. L. 605.  H. B. 227.	Fig. 1 iets hooger.	4.
53. <b>Domeniska.</b>	C. L. 212.	Fig. 7, naar den kelk iets geribd.	5.
54. <b>Ermgaarde zoete.</b>		Fig. 10, naar den kelk ingebogen.	5.
55. <b>Framboosappel, Lange Herfst.</b> Gestreifter Herbst Calvil. Calville d'Automne rayée. Himbeerapfel, Lange Herbst.	Knoop Tab. 2. H. B. 587.	Fig. 5, ook wel hooger naar den kelk sterk geribd, dikwijls naar den kelk gespitst.	2.

Kleur.	TID VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
oudgeel, zonzijde fraai rood over- togen.	Septemb. October.	1 K.	Hoogst.	
troogeel, met geelachtig groen, en fraai licht rood gevamd.	August. Septemb.	1 K.	Hoogst.	
eelachtig groen, met veel karmo- zijnrood gevamd, gestreept, en overtogen, somtijds veel graauwe roest over de geheele vrucht, vooral op Paradijsstam veredeld.	Januar. Mei.	1 T.	Alle vor- men.	In de C. L. en het H. B. is de Syn. Princesse Noble zoete verkeerd aangegeven.
lauzend bleekgeel met veel kar- mozijnroode streepen en vlammen.	August. Septemb.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar.
raai rood, met karmozijnrood over- togen.	Novemb. Decemb.	2 T. 1 K.	Hoogst.	In Duitsland zeer bemind.
roenachtig geel, bijna geheel met glanzend rood overtogen.	August.	1 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar.
roenachtig geel, zonzijde meer citroengeel.	August. October.	1 T.	Voor alle vormen.	Aan te bevelen om vrucht- baarheid, geur en schoonen vorm der vrucht.
roenachtig geel met fraaije donker roode vlam. over de geh. vrucht.	Jan. April.	1 K.	Hoogst.	Een der schoonste en beste zoete appelen, voor de markt aan te bevelen.
roevig geel met veel bloedig rood, en droevig roode streepen en vlammen.	Septemb. Novemb.	2 T.	Hoogst.	Schoone marktvrucht, zeer geurig.



NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.
36. <b>Framboosappel, ronde zomer</b> Haarder Kroontjes. Himbeerapfel, runde Sommer.	Groningen.	Fig. 5, meestal iets lager
37. <b>Glasappel Siberische.</b> Succade appel.	M. v. Noordt. bij Koeverden.	Fig. 5 naar den kelk iets geribd. zeer onregelmatig.
38. <b>Gloria Mundi.</b> American New-York. Glazenwood-Gloria-Mundi. Monstrous pippin. American Mammoth.	C. L. 271.	Fig. 1, weinig geribd naar den kelk.
39. <b>Gravensteiner.</b> Grafen Apfel. Strömbling. Calvil Gravenstein. Gravenstein. Gravensteinder. Blumen Calvillen (soms tijds.)	H. B. 47, en C. L. 297. Zwitserland. Annal. de Pom.: 2—109. M. v. Noordt. in Deutschland.	Fig. 5, noch al veranderlijk, naar den kelk geribd.
40. <b>Hawthornden.</b> White Apple.	C. L. 524. H. B. 575. Annal. de Pom.: 5—29.	Fig. 1.
41. <b>Holaart, zoete graauwe Gorinchemsche.</b>		Fig. 7, doch naar den kelk breeder, met kleine ribben om de kelkhollen.
42. <b>Holaart, zoete blanke.</b>		Fig. 7, iets platter dan de graauwe Holaart, ook meer geribd, naar den kelk rond toeloopend.
43. <b>Herfst, Bloem zoete.</b> Kandij zoete. Goede zoete. Herfst sterrenappel. Waterzoetje.	Knoop Tab. 2. M. v. Noordt.  Ged. van Z. Holland. H. B. 109. C. L. 7. Annal. de Pom. 4—35.	Fig. 4, de kelk in eene diepe holte.
44. <b>Keizer Alexander.</b> Alexander. Aporta Nalivia. Keizerappel. President Napoleon. Korallen Apfel.		Fig. 5, naar den kelk meest spits afgerond, soms tijds ook wel hooger.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
lil groenachtig geel, met veel droevig rood overtogen, waarin karmozijnroode vlammen.	Septemb. October.	2 T.	Pyram. en Leib.	Groeit langzaam doch is zeer vruchtbaar. Annales de Pom. 1—117 is volgens de beschrijving deze soort.
geelachtig wit, met weinig licht roode streepjes of vlammetjes.	August.	4 T.	Alle vormen.	Verschilt met de witte Astrachaner door sterker groei, de takken zijn grover en ruw op 't gevoel, de vrucht is grooter en meer doorschijnend.
groenachtig geel. bijna groenachtig wit.	Novemb. Decemb.	5 T.	Hoogst.	Doorzaans zeer groot.
troogeel met karmozijnroode streepen, vlammen en vlekjes.	Septemb. October.	4 T.	Alle vormen.	Uitnemende geurige appel. op goede gronden zeer vruchtbaar, in de Noordelijke streken van Deutschland zeer bemind.
Bijna wit, zonzijde iets geelachtig, soms tijds eenig licht roode of rosé vlekjes.	October.	1 K.	Hoogst.	Zeer schoon en bijzonder vruchtbaar.
lil groen, zonzijde soms tijds goud geel, met licht bruinrood overtogen, de heele vrucht met graauwen roest hier en daar bedekt.	Jan. April.	1 K.	Hoogst.	Voor kleinronden aanbevolen; uitnemende marktappelen H. B. fol. 63, is geen der in Nederland bekende Holaartappelen.
geelachtig groen, zonzijde schoone roode vlammen en streepen, weinig graauw roest.	Decemb. Februar.	2 K.	Hoogst.	Voor de markt aanbevolen.
troogeel, zonzijde veelal met bruinachtig rood overtogen, waarin soms tijds streepen en vlammen.	October. Decemb.	1 K.	Hoogst.	Buitengewoon vruchtbaar.
groenachtig geel, bijna geheel overtogen met karmozijnroode streepen, vlammen en vlekjes.	October. Novemb.	2 T.	Alle vormen.	Een der schoonste, grootste en waardigste appelen; verlangt beschutte standplaats.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
45. Non such-park. Park 's unvergleichlicher.	C. L. 494. H. B. 471.	Fig. 4. naar den kelk meer afgerond.	4.	Geelachtig groen, zonzijde somtijds met geelachtige streepen en vlam- men.	Novemb. Febr.	1 T.	Pyram. en Leib.	Zeer vruchtbaar, geurig van smaak, de boom blijft klein.
46. Oslin. White Oslin. Abroath pippin.	C. L. 311.	Fig. 4. naar den kelk iets afgerond.	4.	Ligt geel, zonzijde goudgeel, wei- nig roest.	August. Septemb.	1 T.	Pyram. en Leib.	Vruchtbaar, zeer geurig, een- der beste soorten in dezen tij- van 't jaar.
47. Oostindische Compagnie. Gele Oostindische Compagnie. Reinette Sylvanus.		Fig. 5.	4.	Bruinachtig geel, ook wel kaneel- kleurig, veelal met iets graauws bedekt.	Febr. April.	1 T.	Alle vor- men.	Voortreffelijke vrucht, allen meest voor Pyram. en Leiboor- geschikt.
48. Paasch-appel. Easter White.	Knoop tab. 11. C. L. 252.	Fig. 7.	2.	Witachtig geel, zonzijde meest met hoog rood overtoegen, weinig vlammen of streepen, somtijds bij de steelholte eenig roest.	Maart. Mei.	2 K.	Hoogst.	Duurzaam en mild dragend
49. Paradijs dubbelde zuren.	Knoop tab. 12.	Fig. 8, veelal met ribben over de ge- heele vrucht.	5.	Groenachtig geel, over de geheele vrucht met donkerrood overtoegen.	Maart. April.	1 K.	Hoogst.	Op de markt zeer gezocht.
50. Pariser Rambour. Reinette du Canada blanche.  Reinette du Canada à côtes. Reinette de Portugal. Reinette Windsor. Reinette d'Andilly. Rumelin Reinette. Pariser Rambour Reinette.	Annal. de Pom. 2—55. C. L. 640.  Württemberg. H. B. 119.	Fig. 5. zeer veran- derlijk, naar den kelk sterk geribd, welke ribben som- tijds over de ge- heele vrucht loo- pen.	2.	Stroogeel, aan de zonzijde somtijds met ligt bruinachtig rood over- toegen, meestal met veel graauw roest over de vrucht, veel groote graauwe stippen.	Jan. April.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer aan te bevelen. Duitschland beroemd
51. Pearmain, English Winter gold. Winter Gold Parmäne. Hampshire Yellow. King of the Pippins.  Reine des Reinettes. Jones's Southampton pippin.	H. B. 165. C. L. 585. Annal. de Pom. 6—11. in Frankrijk.	Fig. 5. zeer volko- men.	2.	Glad goudgeel, somtijds oranje, zon- zijde goudachtig rood, waarin som- tijds karmozijnroode streepjes.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vor- men.	Vruchtbare en uitmonden appelen; een der schoonste heden in den handel.
52. Peper-appel. Bristol Reinette. Reinet Tulpa.	Zeeland.	Fig. 6.	4.	Geelachtig groen, zonzijde met don- kerrood overtoegen, veel bruin- graauw roest.	Jan. April.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Uitmonden tafelappel
53. Pigeon blanc. Blanke Poom. Lekkerbeetje. Weiszer Winter Taubenapfel.	Knoop tab. 11.  N. Holl. H. B. 447.	Fig. 7.	4.	Wit wasachtig geel, met rosé en karmozijnroode vlammen en streepen.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vor- men.	De Pigeonnet in Frankrijk niet deze soort.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<b>54. Pigeon rouge.</b> Roode Poom. Lekkerbeetje. Rother Winter Taubenapfel. Arabian-apple. Pomme de Jérusalem. Königlicher Taubling. Coeur de Pigeon. Schönnetchen. Buschnetchen. Mariënhemdchen. Winter Zijdehemdje.	Noordholland. H. B. 107. C. L. 382.  in Saksen.  Overijssel.	Fig. 7.	4.	Witachtig geel, bijna geheel met paarschachtig rood overtogen, somtijds donkerroode vlammen.	Novemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	
<b>55. Pippeling, Downton's.</b> Downton. Knight's Golden pippin. Elton pippin. Elton Golden pippin. Knight's pippin. Saint Marij's pippin.	C. L. 217. H. B. 475.	Fig. 6, iets platter, somtijds kleine verhevenheden om de kelkholte.	4.	Citroengeel, zonzijde goudgeel, met veel bruine stippen, regelmatig verspreid.	Novemb. Febr.	1 T.	Pyr. en Leib.	Draagt veel spoediger dan de gewone goudpippeling, komt in hoedanigheid met dezelve overeen; de vruchten aan trossen bij elkander.
<b>56. Pippeling dubbelde gouden.</b> Reinet van Vilsteren. Pippin d'or double.	Overijssel.	Fig. 4.	4.	Ligt citroengeel, zonzijde goudgeel, met veel regelmatig verdeelde bruingraauwe stippen.	Novemb. Jan.	1 T.	Pyr. en Leib.	Voor hoogst, verlangt deze soort beschutte standplaats, is zeer vruchtbaar, van uitmuntende hoedanigheid.
<b>57. Pippeling gouden.</b> Goudappel. Golden Pippin. Englisch-Old-Balgone — Milton-Baijfordburij — Russet-Herfordshire — London-Warter's Golden Pippin American plate. Pippin d'or.	Knoop Tab. 9. C. L. 218. Annal. de Pom., 5—21.	Fig. 6, wat veranderlijk, meest meer hoog dan breed of dik.	4.	Citroengeel, zonzijde goudgeel, met veel bruine stippen regelmatig verdeeld.	Jan. Maart.	1 T.	Pyr. en Leib.	Voor hoogst, verlangt deze soort warme standplaats. Anales de Pom. 5—13 is eene verassing in de Synoniemen.
<b>58. Pippeling, Zoete goud.</b>		Fig. 4.	5.	Citroengeel, zonzijde goudgeel, met weinig rood.	Novemb. Jan.	2 K.	Hoogst.	
<b>59. Pippeling, Hughes gouden.</b> Golden pippin, Hughes's Hughes's New Golden pippin. Hughe's Gold peping.	C. L. 284. H. B. 289.	Fig. 6, ook wel iets platter, meest wat eenzijdig of scheef gevormd.	4.	Citroengeel, zonzijde iets goudgeel, somtijds veel graauws over de vrucht verspreid.	Novemb. Febr.	1 T.	Pyr. en Leib.	Uitmuntende soort, de boom blijft klein, is zeer vruchtbaar.
<b>60. Pippeling, Kerry.</b> Kerry pippin. Edmonton's Aromatic pippin. Citroen pippeling.	C. L. 380.	Fig. 6, naar den steel iets citroenvormig.	4.	Citroengeel met rood.	Septemb. October.	1 T.	Pyr. en Leib.	Vruchtbaar, de boom blijft klein, geurige vrucht.
<b>61. Pippeling, graauwe Engelse.</b> Kentish Pippin. Pippeling Kent.	Knoop Tab. 6. C. L. 578.	Fig. 10, iets korter, naar den kelk minder spits, rond den kelk iets geribd.	5.	Droevig groenachtig geel, zonzijde roodachtig gevland en gestreept, veel graauw over de vrucht.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR VELD-KEK BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
62. <b>Pippeling, Konings.</b> Koningsappel.		Fig. 4. naar den kelk wat afgerond. in de kelkholte zeer kleine ribben.	5.	Groenachtig geel, somtijds iets goudgeel en rood aan de zonzijde, eigenaardig met graauwe stippen en figuren overdekt.	Jan. Febr.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
65. <b>Pippeling London.</b> London pippin. Five Crown pippin. New London pippin. Royal Somerset.	C. L. 410.	Fig. 5.	3.	Matgeel, zonzijde donker karmozijnrood, en vele bloedkleurige vlammen en streepen.	Febr. April.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar.
64. <b>Pippeling Pearmain.</b> Pearmain Autumn. American Pearmain. Sommer Parmäne. Englischer Birn Reinette. Schleswiger Erdbeerapfel.	Knoop Tab. 2. C. L. 531. H. B. 541.	Fig. 5. veelal scheef gevormd. aan den steel meestal van een vleesachtig uitwas voorzien.	5.	Droevig geel, zonzijde met veel rood overtoegen, waarin karmozijnroode streepen en vlammen, veelal ook iets graauws over de vrucht verspreid.	Septemb. October.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
65. <b>Pippeling, Russische.</b>		Fig. 4.	4.	Zeer glad, goudgeel, zonzijde bijna oranje met iets roods.	Decemb. Febr.	1 T.	Alle vormen.	
66. <b>Pippeling, Wijker.</b> Pomme Madame. Reinette Bellefleur. Konings handappel (soms.) Orleans Reinette. Triumph Reinette. New-York Reinette. Pearmain Doré. Cardinal pippin. Peping von Holland. Reinette Glasgow. Court-pendu blanc. Princesse Noble. Reinette Golden. Kirke's Golden Reinette. Yellow German Reinette. Aurore. Reinette d'Aix. Court-pendu Doré. Elisabeth. Megginch Favourite. Dundee.	Knoop Tab. 11. in Groningen en Friesland. H. B. 159.  in Oostenrijk.  Jodoigne. Frankrijk. C. L. 661.	Fig. 4. ook wel iets hooger.	4.	Goudgeel, somtijds iets droevig; goudgeel, zonzijde rood overtoegen, waarin karmozijn roode vlammen en streepen.	Decemb. Febr.	1 T.	Alle vormen.	Uitnemende schoone en voortreffelijke tafelpappel, getuize zijne verspreiding door geheel Europa.
67. <b>Prinsen-appel.</b> Prinzapfel. Nonnenapfel. Melonenapfel. Trompetenapfel. Englischer Flaschenapfel.	H. B. 57.  Holstein, Bohemen, Noorwegen.	Fig. 9.	5.	Citroengeel met levendig karmozijnrood gevlamd en gestreept.	Septemb. Novemb.	1 T.	Alle vormen.	In alle opzigten uitmuntend voor de markt aan te bevelen.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in :	Vorm.	GRROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Ananas apfel. Rothgestreifter Schlotterapfel. Nonentütte.	Thuringen. Bremen.							
68. <b>Princesse noble.</b> Fransche kroon. Nobles. Alant-apfel. Pomme Carrée. Prince d'Orange ( <i>Belgie.</i> )	Knoop Tab. 6. Friesland. Overijssel. H. B. 249. Frankrijk. Annal. de Pom. 5—3.	Fig. 7. naar den kelk meer plat rond, veelal verschillend in vorm.	5.	troengeel, met veel karmozijn roode streepen en vlammen; de huid is, als de vrucht rijp wordt, zeer vetzig op het gevoel.	October. Decemb.	2 T. 1 K.	Alle vor- men.	Zeer vruchtbaar. voor de markt aan te bevelen.
69. <b>Princesse noble, zoete.</b>		Fig. 9. naar den kelk wat afgerond.	5.	ligt goudgeel, aan de zonzijde fraai karmozijnrood gevlamd en gestreept.	October. Novemb.	2 K.	Hoogst.	
70. <b>Rabau, blanke Herfst.</b> Bloemzuur. Sommer Rabau.	Knoop Tab. 5.	Fig. 4. naar den kelk meer afgerond.	4.	ligt groen, weinig geel, zonzijde met licht roode streepen en vlam- men.	Septemb. Novemb.	5 T. 2 K.	Hoogst.	
71. <b>Rabau, roode.</b> Rother-Cardinal ( <i>vermoedelijk.</i> )	H. B. 111.	Fig. 4. altijd iets platter dan de blan- ke Rabau.	5.	roenachtig geel, bijna geheel met karmozijnrood gevlamd en ge- streept.	Septemb. Novemb.	5 T. 2 K.	Hoogst.	Zeer fraai.
72. <b>Reinette Bretagne.</b>	H. B. 509.	Fig. 4. naar den kelk meer afgerond. de kelk in eene groote holte, bij den steel veeltijds een uitwas.	5.	oudgeel, aan de zonzijde met don- ker karmozijnrood overtogen, ge- streept en gevlamd.	Novemb. Jan.	1 T.	Alle vor- men.	Schoone, uitmuntende appel. zeer vruchtbaar.
73. <b>Reinette d'or.</b> Grosze Casseler Reinette. Holländische gold Reinette. Dutch Mignonne. Pomme de Laak. Copmanthorpe Crab.	H. B. 165. C. L. 225.	Fig. 5. iets meer plat.	2.	roenachtig geel, aan de zonzijde ligt karmozijn roode streepjes. ook wel graauwe roest, vooral in de steelholte.	Maart. Mei.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Draagt bijna alle jaren over- vloedig. goed om te drogen. Annales de Pom. 1—83 niet de regte; in den C. L. de Syno- niem "Paternosterappel" ook niet goed.
74. <b>Reinette d'or. roode.</b>		Fig. 5. iets meer plat.	2.	roenachtig, bijna geheel met rood overtogen, waarin aan de zonzijde donkerder streepen en vlammen.	Maart. Mei.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Gelijkt in alles naar de Rei- nette D'or, is wel zoo fijn, de kleur der huid maakt bijna het eenige verschil uit.
75. <b>Reinette, dubbelde zure graauwe.</b> Reinette grise. Reinette graauwe.	Knoop Tab. 9.	Fig. 5. doch naar den kelk iets platter, bijna effen rond.	2.	eelachtig groen, zonzijde bruin rood, zoo sterk met bruinen roest overdekt, dat het groen en bruin er slechts doorheen schemert.	Jan. Febr.	2 T.	Hoogst. Pyram.	Verlangt beschutte stand- plaats, de vrucht hangt zeer los aan den boom.
76. <b>Reinette, Fransche.</b> Reinette de France gris. Reinette Fransche graauwe. Gouvernante.	C. L. 656. Westland.	Fig. 2. naar den kelk iets platter, kleine ribben om den kelk.	4.	roevig geelachtig groen, zonzijde iets bruin rood, bijna geheel over- dekt met bruin graauw roest, de graauwe stippen somtijds ster- vormig.	Maart. April.	1 T.	Pyr. en Leib.	Verlangt eene warme stand- plaats.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
77. <b>Reinette Krappe Kruin.</b> Krappe kruin. Pomme Durand. Dubbelde gele Reinet.	C. L. 590. bij Knoop Tab. 10.	Fig. 6, naar den kelk wat breeder, om den kelk geribd.	2.	roenachtig geel, zonzijde iets rood- achtigs. veel bleek graauw roest.	Febr. Maart.	1 T.	Hoogst en Pyr.	Wordt dikwijls verward met de dubbele zure graauwe Rei- net, deze soort is beter.
78. <b>Reinette Karakter.</b> Reinette Marbree, Reinette Valkenier. Karakter appel. Netjes appel. ook wel: Drap d'or.		Fig. 5, bij den kelk zeer kleine ribben.	4.	roengeel, zonzijde met karmo- zijnrood, ook wel bruinrood over- togen, de gansche vrucht met eigenaardige figuren, als hiro- glyfen, netjesgewijze overdekt.	Febr. Maart.	1 T.	Hoogst en Pyr.	
79. <b>Reinette Monstrueux.</b> Reinette Montfort. Gulden Reinette. Reinette Montmorency.		Fig. 5.	2.	roevig geel, aan de zonzijde fraai met licht roode streepen, veelal met geelachtig bruinen roest hier en daar overtogen.	Decemb. Febr.	1 T. 1 K.	Alle vor- men.	Een der grootste en uitmun- tendste appelen hier bekend.
80. <b>Reinette Nelguin.</b> Reinette Aizerna.	Knoop tab. 9. C. L. 650. M. v. Noordt.	Fig. 5, met kleine ribben om den kelk.	4.	gelachtig groen, zonzijde iets buin geel, met veel bruinen roest, waar de grondkleuren doorschemeren.	Febr. Maart.	1 T.	Alle vor- men.	Groeit niet sterk, H. B. pag. 373 beschreven Reinette van Breda, met de syn. "Nelguin" is niet dezelfde.
81. <b>Reinette Nonpareille.</b> Nonpareil old. Nonpareil English. Duc d'Arzel. Hunt's Nonpareil. Loveden's pippin. Pomme Nonpareille.	Knoop Tab. 9. C. L. 476.	Fig. 2.	4.	asgroen, zonzijde met bruinrood overtogen, de geheele vrucht met veel graauw roest bijna overdekt.	Maart. April.	1 T.	Pyram. en Leib.	Verlangt eene warme stand- plaats, is anders in rang 2 T.; in Annales de Pom. 4-53 niet de echte soort.
82. <b>Reinette, Praagsche.</b>		Fig. 4, naar den kelk meer afgerond, zeer kleine ribben om de kelkholte.	4.	roenachtig geel, aan de zonzijde soms tijds met iets bruinrood als gevlamd, meest met licht kaneel- kleurigen roest geheel bedekt.	Febr. April.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Voor de markt en om te drogen zeer aan te bevelen. Vruchtbaar.
83. <b>Reinette van Karendsveld.</b>		Fig. 7, om den kelk kleine ribben, en een weinig groen, kelk gesloten.	5.	roengeel, aan de zonzijde iets roods, overal bezet met groote lichtbruine stippen, zeer weinig graauw	Januar.	1 T.	Alle vor- men.	
84. <b>Reinette van Zorgvliet.</b>	Knoop Tab. 9.	Fig. 4, zeer groot, som- tijds ongelijke ver- hevenheden, vooral naar den steel.	2.	roevig roenachtig geel, zonzijde met bruinachtig rood als over- togen, veel graauwen roest over de geheele vrucht.	Januar. Maart.	1 T.	Alle vor- men.	H. B. fol. 261, is niet de echte.
85. <b>Reinette Verte.</b> Groene Reinette.		Fig. 2, doch door- gaans hooger, en naar den kelk rond toeloopend.	5.	gt groen, zonzijde met paars- achtig rood overtogen, waarin donker vlammen, in het groen sterk met kleine graauwe stip- pen regelmatig bezet, weinig roest.	Febr. April.	1 T. of 2 T.	Hoogst. en Pyr.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	gemaakt in:	Vorm.	GROO.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
86. Reinette Wellington.		Fig. 4, over de geheele vrucht ongelijke vlakke-vevenheden.	5	soevig geel, zonzijde ligtrood met geel vermengd, waarin eenige karmozijnroodestreepen; weinig roest.	Januar. Febr.	1 T.	Alle vormen.	
87. Reinette, Zure.	M. v. Noordt.	Fig. 2, meer afgerond, om den kelk kleine ribben, over de vrucht loopen meestal vier vevenheden, welken den appel als een hoekig aanzien geven.	5	elachtig groen, zonzijde met bruin rood overtogen als ééne vlek, van de steelholte af bijna geheel met bruinen roest bedekt. 't welk naar den kelk zich in het groen en bruin verliest. hier en daar aschgrauwe stippen.	Febr. Maart.	2 T. 1 K.	Hoogst. en Pyr.	Deze soort en de dubb. zure graauwe Reinette worden dikwijls met elkander verward, de vrucht verschilt veel.
88. Reinette, zoete graauwe. Kaneelzoete. Graauwe zoet. Pomme d'Orange.	Knoop Tab. 12. Westland. N. Brabant. Goes.	Fig. 2.	5	neekleurig bruin, zonzijde bruinachtig rood, de huid is zeer ruw op het gevoel.	Maart. April.	1 K.	Hoogst.	Verlangt een' vetten kleigrond; op de markt zeer gezocht.
89. Reinette, zoete graauwe Goud.	Knoop Tab. 12. M. v. Noordt.	Fig. 3, naar den kelk meer spits afgerond.		oudachtig geel, bijna geheel overtogen met kaneelkleurig graauw.	Decemb. Januar.	1 K.	Hoogst.	Groeit langzaam, verlangt eene beschutte standplaats.
90. Reinette, zoete graauwe Goud. Afwijking van den Wijker Pippeling.	Annal. de Pom. 14—69.	Fig. 4.		neekleurig, geheel met graauw overtogen, zonzijde somtijds iets roods.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyr. en Leib.	Deze voortreffelijke appel verloopt wel eens naar den Wijker pippeling.
91. Schijveling, Vlaamsche. Banket Schijver. Court-pendu d'Automne. Court-pendu d'Eté. Fransche Schijver Doppelte Zwiebelappel Rouette de Flandre. Pomme de France.	N. Brabant.	Fig. 1, meest scheefvormig.	5	rooigeel, met fraai karmozijnrood gestreept en gevlamd, aan de steelholte veel ligtgraauwen roest.	Septemb. October.	3 T. 2 K.	Hoogst.	Goed om te drogen, schoon vrucht. Vruuchtbaar.
92. Schijveling, Zure. Zure Kan. Kaasjes-appel. Ajuin-appel. Zwiebel-appel. Zipollen-appel. Zwiebel Bosdoffer.	Knoop Tab. 7. Groningen. Flakké.  H. B. 505.	Fig. 2, naar den kelk meer afgerond.	4	ligt strooigeel, zonzijde met ligt rood overtogen, naar de steelholte met ligt graauwen roest bezet.	Maart. April.	1 K.	Hoogst.	Op de markt zeer gezocht om te drogen uitmuntend.
95. Schijveling, Zoete. Zoete Kan-appel.	Knoop fol. 10.	Fig. 1, meest hooger.	5	soevig bleek geel, somtijds iets roods aan de zonzijde, veel graauwe stippen.	Januar. Febr.	2 K.	Hoogst.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GRON.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEX BOONVORM.	OPMERKINGEN.
94. Seedling, Jeffrey's.	C. L. 564.	Fig. 3, naar den kelk meer spits afgerond, om den kelk ribachtig.	2	soevig geel, zonzijde met karmozijnrood overtogen, waarin roestfiguren, om den kelk eenige licht graauwe roest.	Decemb. Febr.	2 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer schoon.
95. Somerset Lasting.	C. L. 782.	Fig. 4, naar den kelk sterk geribd, ook wel zonder ribben.	4	ligtgeel, zonzijde fraai rood overtogen, vol kleine karmozijnroode stippen, heeft een wasachtig aanzien.	Febr.	1 K.	Hoogst.	Allerschoonste vrucht, de keuken aan te bevelen, zeer vruchtbaar.
96. Tower of Glammis. Glammis Castle. Late Carse of Gowrie.	C. L. 855.	Fig. 3, doch in plaats van ribben ongelijke verhevenheden over de geheele vrucht.	2	oenachtig, zonzijde meer stroogeel, zelden iets roods, met lichtbruine stippen, onregelmatig verdeeld.	Januar. Febr.	2 T. 1 K.	Hoogst.	
97. Winterbloemzoet, Doesburgsche. Pokappel. Sterrenappel. Winter	Knoop Tab. 7. Overijssel.	Fig. 4, naar den kelk meest spits afgerond en met kleine ribben omgeven.	2	leek geelachtig groen, zonzijde somtijds rood overtogen.	Januar. Febr.	2 K.	Hoogst.	Vruchtbaar, zeer marktvrucht.
98. Zon-Zoete.		Fig. 4, naar den kelk afgerond.	5	udgeel, zonzijde fraai rood overtogen.	Decemb. Januar.	2 K.	Hoogst.	Goede marktvrucht. In landman zeer bemind.
99. Zoete Veen. Keesjes-appel. Bosjes-appel. Trosjes-appel. Süsser Mohrapfel.	Knoop Tab. 10. Noordbrabant. Brielle.	Fig. 1.	4	rauwachtig groen, bijna geheel met bruinroode vlammen en streepen.	April. Junij.	1 K.	Hoogst.	
100. Zijde Hemdje.	Knoop Tab. 5. pag. 6?	Fig. 7, naar den kelk iets breed rond toeloozend, naar den steel iets geribd.	4	rauwachtig geel, zonzijde met iets roodachtig overtogen, zeer gladde huid, in de steelholte een weinig roestig.	Septemb. October.	1 T. 1 K.	Pyram. Hoogst.	H. B. fol. 403, is niet de Hier meestal vroeger rij bij Knoop is beschreven



2.

P E E R S O O R T E N .

EERSTE GEDEELTE.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOORVELKEN BOOIVORM.	OPMERKINGEN.
1. <b>Angora.</b> Die Schöne Angevine. Belle Angevine. Bolivar. Très-Grosse de Bruxelles. Royale d'Angleterre. Beauté of Comtesse de Tervueren. Winter Duchesse de Berry.	C. L. 12. H. B. 557. Journal de Lyon.	Fig. 12, doch meest dikker, vooral naar den kelk.	1.	bevig groenachtig geel, zonzijde bruinachtig rood, ook wel iets gestreept, lijne graauwe stippen.	Jan. Maart.	1 K.	Hoogst.	Verlangt beschutte standplaats om de zeer groote vrucht
2. <b>Alexandre Lambree.</b>	H. B. 549. Annal. de Pom. 2—94.	Fig. 2, naar den steel tolvormig toeloo-pend, somtijds eene flaauwe inbuiging.	3.	bevig geel met bruinen roest om den kelk, veelal ook over de geheele vrucht.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vormen.	Zeer vruchtbaar.
3. <b>Arbre courbé.</b> Amiral.	C. L. Suppl. Journal de Lyon.	Fig. 9, naar den kelk eivormig afgestompt in de inbuiging, eigenaardig met kleine ribbetjes overlans de vrucht.	2.	bevig geelachtig groen, met veel graauwe stippen, een weinig roest bij steel en kelk.			Alle vormen.	
4. <b>Beau présent d'Artois.</b> Königsgeschenk von Neapel De Livre. Gros Rateau gris. Rateau gris. Kronbirnen. Present Royal de Naples.	H. B. 159. C. L. 296.	Fig. 11, naar den steel veelal eene flaauwe inbuiging, naar den kelk regelmatig afgerond.	1.	bevig geelachtig groen, zonzijde bruinachtig rood overtogen, over de geheele vrucht veel bruine roest.	October. Novemb.	1 T.	Hoogst. Pyram.	
5. <b>Belle épine Dumas.</b> Die Dumas Herbstdorn. Epine Dumas. Duc de Bourdeaux. Colmar du Lot. Belle épine Limoges. Limousine.	H. B. 515. G.L. Suppl. 24. Journal de Lyon.	Fig. 11, naar den steel ook wel een weinig ingebogen.	3.	ek groen, iets geelachtig, zonzijde, ligt rosé overtogen, meest zonder rosé, vol kleine groenachtige graauwe stippen.	Novemb.	5 T.	Pyr.	
6. <b>Belle Andréinne.</b> Pastoren Birne. Schöne Andrine. Poire de Curé. Poire de Clion. Belle de Berry. Comice de Toulon. Vicar of Winkfield.	H. B. 505. Journal de Lyon. An.d.P. 2—21. C. L. 425.	Fig. 12, in het midden echter veel dikker, de steel meestal eenzijdig geplaatst.	1.	groen, met veel groote graauwe stippen, en roest, vooral naar den kelk.	Novemb. Decemb.	5 T. 2 K.	Hoogst.	
7. <b>Bergamotte Crassanne.</b> Bergamotte Crésane. Beurré Plat. Die Crassanne. Crassanne d'Automne. Kaiserbirn. Langstielige Bergamotte. Rattenschwanz.	An. d. P. 2, 61. M. v. Noordt. H. B. 145.	Fig. 4, somtijds naar den steel meer rond, somtijds flaauw ingebogen toeloo-pend, de kelk diep liggend tusschen kleine verhevenheden, zeer lange steel.	3.	achtig groen, met veel bruine stippen en roest hier en daar bedekt.	Novemb. Decemb.	2 T.	Leib.	Verlangt eene warme standplaats, scheurt op natte grond veelal.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL-KEY BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
8. <b>Bergamotte, dubbelde.</b> Blanke Diamantpeer. Bergamotte d'Alençon, Prinsenpeer.	M. v. Noordt.	Fig. 2.	4.	geelachtig groen, zonzijde ligt bruin-rood overtoegen, aan den kelk, en aan den steel ligt graauw bruin roest.	Septemb. October.	5 T. 2 K.	Hoogst.	
9. <b>Bergamotte, Herfst.</b> Sappige Groentjes. Mandjes-peer.	Noord-Holland. Knoop Tab. 2.	Fig. 1.	4.	donker groen, zonzijde bruin rood overtoegen, veel graauw bruine stippen ook wel roest om denkelk.	Septemb. October.	1 T.	Hoogst.	
10. <b>Bergamotte, Winter Kortsteelde.</b>	M. v. Noordt.	Fig. 4. doch meest iets hooger, en rond toeloopt aan de steel.	4.	geel groen, met veel groote graauwe stippen, aan kelk en steel, ligt bruinachtigen roest.	Januar. Febr.	5 T. 2 K.	Hoogst.	
11. <b>Bergamotte de Pentecôte.</b> Doyenne d'hiver. Winter Dechantsbirne. Grüne Winter Herrnbirne. Lauers Englische Osterbutterbirne. Beurré de Printemps. Doyenné de Printemps. Sylvagne d'hiver. Philippe d'hiver. Poire Anglaise. Beurré Easter. Beurré d'hiver de Bruxelles. Bezi Chaumontel très-gros. Canning, Seigneur d'hiver. Philippe de Pâques. Pastorale de Louvain. Bergamotte Crassanne d'hiver.	Annal. de Pom. 14—41. H. B. 177.  C. L. 68.	Fig. 5. zeer verschillend in vorm.	2.	gevig geelachtig groen met veel bruin graauwe stippen, somtijds iets somber rood aan de zonzijde, heeft veelal aan steel en kelk bruinen roest.	Januar. April.	1 T.	Alle vormen.	Verlangt eene warme standplaats, is vroeger ten onrechte veel verward met Bergamotte de Pâques, en onder dien naam verspreid, bij M. van Noordt mede onder bovengenoemden naam beschreven.
12. <b>Bergamotte de Pâques.</b> Die Osterbergamotte. Bergamotte Easter. Bergamotte d'hiver. Bergamotte de Bugi. Bergamotte de Toulouse. Roberts' Keeping. Terling, Royal Tairlon.	H. B. 569. C. L. 51.	Fig. 2, naar den steel ook wel iets ingebogen.		geel groen met veel bruin graauwe stippen, en ook wel roest.	Januar. Maart.	5 T. 2 K.	Alle vormen.	Verlangt eene zeer goede en warme standplaats.
15. <b>Buerré blanc.</b> Blanke Beurré. Goudpeer. Blanke Poire-Seigneur. Weisze Herbst-Butterbirne. Doyenné blanc. Doyenne White. White Beurré. Dean's, Snow Pear. Pines Pear. Warwick Bergamotte.	M. v. Noordt. Flakkée. H. B. 109. Frankrijk. C. L. 202.	Fig. 3, naar den steel veel spits rond toeloopt, ook wel iets ingebogen.		geelachtig geel, ook wel iets citroengeel, met ligt bruinen roest en stippen.	Septemb. October.	1 T.	Pyr. Leib.	Wordt dikwils verward met de Poire de Seigneur of Doyenne gris.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR AVELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
St. Michal. Kaiserbirne. Pera Spada.	Oostenrijk. Italië.							
14. <b>Beurré Bretonneau.</b> Poire Docteur Bretonneau.	Annal. de Pom. 7—97.	Fig. 5. ook wel iets meer spits toeloo- pend naar den steel.	2	roevig groenachtig met geel ver- mengd, zonzijde een weinig goud- geel, graauwe stippen en roest, figuren over al verspreid.	Jan. Maart.	2 T.	Pyram. Leib.	
15. <b>Beurré bronzé.</b> Broncirte Herbstbirne.	H. B. 527.	Fig. 5.	5	Groenachtig geel, geheel over- geen met ligten bruinen roest.	Novemb.	1 T.	Pyram.	
16. <b>Beurré Capiaumont.</b> Die Capiaumont. Beurré Aurore. Callebasse Vass.	H. B. 95. Frankrijk. C. L. 262.	Fig. 11. naar den steel meest meer spits toelooepend, zelden weinig ingebogen.	5	Ligt geel, bijna geheel met kelk- kleurigen roest bedekt zonzijde heel roodbruin overtogen, ruwe uid.	October.	1 T.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar.
17. <b>Beurré Clairgeau.</b> Clairgeau's Butterbirne.	H. B. 505. Annal. de Pom. 2—105.	Fig. 14, meestal aan de eene zijde blaauw ingebogen, de steel veeltijds aan eenen kant ter zijde.	4	Goud geel, zonzijde bruin rood overtogen, geheel overdekt met kelk- kleurigen roest, veel ligt grijze stippen.	October. Decemb.	1 T.	Alle vor- men.	Zeer vruchtbaar, groeit niet sterk, een der voortreffelijkste peren, sedert kort inden han- del.
18. <b>Beurré d'Amanlis.</b> Wilhelmine (v. Mons.) Amanlis Butterbirne.	Annal. de Pom. 6—25. H. B. 71. C. L. 451.	Fig. 6, naar den steel iets ingebogen, naar den kelk stomp rond toelooepend.	2	Groenachtig geel, aan de zon- zijde iets bruinrood overtogen, heel kleine graauw groene stippen.	Septemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
19. <b>Beurré d'Arenberg.</b> Orpheline d'Enghien. Colmar Dechamps. Beurré Dechamps. Duc d'Arenberg. Arenberg Parfait. Beurré des Orphelins. Die Arenberg. Aremberger Butterbirne. Beurré d'Arenberg.	Annal. de Pom. 5—55. Journ. d. Lyon.       H. B. 557. C. L. 55.	Fig. 6, naar den kelk meest afgerond, ook naar den steel wel eens ingebogen, zeer veranderlijk.		Droevig geel, aan de zonzijde zel- ven iets ligter rood, vol bruine stippen, naar den steel en kelk ook over de vrucht (hier en daar) bruine best.	Decemb. Jan.	1 T.	Pyram. Leib.	Zeer vruchtbaar, uitmuntende tafelvrucht, verlangt eene war- me standplaats.
20. <b>Beurré d'Hardenpont.</b> Hardenpont's Winter Butterbirne. Kronprinz Ferdinand von Oestereich. Amalia von Brabant. Goulu Morceau. Glou Morceau de Cambrou. Hardenpont d'hiver. Schinkenbirne. Beurré d'Arenberg (verkeerd). Bon-Chrétien Fondante. Beurré de Kent. Beurré Lombard. Linden d'Automne.	An. d. P. 2—9. Journ. de Lyon. H. B. 169.       C. L. 250.   Darmstad. in Frankrijk.	Fig. 9. noch al bultig.		Groenachtig geel, met veel bruine stippen, hier en daar met bruinen best overtogen.	Decemb. Februar.	1 T.	Alle vor- men.	Verlangt voor gewone Hoogst. eene warme standplaats, uit- muntende vrucht. Goulu- Morceau is de Waalsche uitdrukking voor lekker stuk of lekkere beet.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
21. <b>Beurré de Lucon.</b> Beurré gris d'hiver nouveau. Beurré gris superieur.	Journ. d. Lyon. Annal. de Pom. 7—71. C. L. 70.	Fig. 7, naar den steel meer afgerond, ook wel iets langer.	2.	gt bruin, hier en daar geel door- schijnend, zonzijde roodbruin overtogen.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram. Leib.	Warme standplaats, scheurt anders veel.
22. <b>Beurré de Merode.</b> Double Philippe. Die doppelte Philipsbirne. Beurré de Merode Westerloo. Beurré de Westerloo. Doyenne Boussoch.	An. de P. 5—84. Journ. de Lyon. H. B. 455.  C. L. 198.	Fig. 7, zelden iets langer.	2.	gt geel, zonzijde een weinig rood, vol bruin graauwe stippen, en veel ligt bruinen roest.	Septemb. October.	1 T.	Alle vor- men.	Uitmuntende vrucht, zeer aan te bevelen, warme stand- plaats.
23. <b>Beurré de Rance.</b> Späte Hardenpont. Beurré de Ranz. Beurré Epine. Bon-Chrétiën de Rans. Beurré Norchain. Hardenpont de Printemps. Beurré Bon-Chrétiën.	C. L. 77. H. B. 175.  Journ. d. Lyon. An. d. P. 5—45.	Fig. 11, naar den steel meest inge- bogen, naar den kelk rond toeloo- pend, zeer bultig en veranderlijk.	5.	elachtig groen, met bruinen roest, en fijne graauwe stippen, roest- vlekken en figuren.	Jan. Febr.	2 T.	Leib.	Verlangt eene zeer warme standplaats.
24. <b>Beurré Diel.</b> Meloenpeer (verkeerd). Diels Butterbirne. Beurré Magnifique. Beurré Incomparable. Beurré Royal. Beurré des Trois Tours. Dry Toren. George Podiebrad.	An. d. P. 4—57. Journ. d. Lyon. H. B. 165. C. L. 65.  Bohemen.	Fig. 7, ook wel iets langer.	2.	oenachtig geel, met roodbruinen roest als overdekt, vol groote graauwe stippen.	Novemb. Jan.	1 T.	Alle vor- men.	Zeer aan te bevelen, uitmun- tende tafelpeer.
25. <b>Beurré Dumortier</b> (van Mons.)		Fig. 5.	5.	oevig geelachtig groen, zelden een weinig rood aan de zonzij- zijde, kleine graauwe stippen, aan den steel wel eens wat roest.	Septemb. October.	1 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar, uitmunten- de peer, groeit niet sterk.
26. <b>Beurré Goubault.</b>		Fig. 2, de kelk vlak, zonder holten, naar den kelk kleine ribben.	5.	elachtig groen, met weinig brui- nen roest overtogen.	Septemb.	1 T.	Alle vor- men.	
27. <b>Beurré gris d'Automne.</b> Graauwe Beurré. Graue Herbst Butterbirne. Beurré Brown. Beurré Doré. Beurré du Roi. Badham's.	Knoop Tab. 7. H. B. 99. C. L. 60. An. d. P. 1—55.	Fig. 9, wel wat ver- anderlijk.	2.	elachtig groen, bijna geheel met bruinen roest overtogen, zonzijde zelden een weinig rood.	October.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Hier te lande het best als leiboom voor eenen muur.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in :	Vorm.	GRÖÖT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKE BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Beurré d'Ambleuse. Beurré d'Amboise. Isambert. Beurré gris. Isambert le bon.	Journ. de Lyon.							
28. Beurré James Watt.		Fig. 11 naar den steel meest ingebogen, naar de kelk wat afgerond met kleine ribben omgeven.	2	roevig geelachtig groen, zonzijde veel bruinen roest, met karmozijn rood als vermengd.	October. Novemb.	1 T.	Alle vormen.	Aan te bevelen.
29. Bezy (Besi) de Chaumontel. Chaumontel. Die Chaumontel. Winter Butterbirne. Reine des Pays-Bas. Beurré d'Hiver. Beurré de Chaumontel. Oxford Chaumontel.	Knoop tab. 8. M. v. Noordt. H. B. 175. C. L. 140.  Journ. de Lyon.	Fig. 9. ook wel iets langer, zeer hultig, naar den kelk geribd.	2	graauwachtig groen, de zonzijde bruin rood overtogen, bijna geheel met bruinen roest overdekt.	Novemb. Febr.	1 T.	Hoogst. Leib.	Verlangt eene zeer goede standplaats, liefst voor eenen muur.
50. Bezy (Besi) van Schonauwen. Winter Vijgepeer Bezy Derhy.	M. v. Noordt. Gelderland.	Fig. 10. naar den kelk rond toeloopend en geribd.	5	geelachtig groen, zonzijde meer goudgeel, vol kleine groen graauwe stippen.	October. Novemb.	2 T.	Alle vormen.	Gewonnen op het landgoed Schonauwen in de Provincie Utrecht.
51 Bloodgood.	C. L. 96.	Fig. 5, naar den steel eirond toeloopend.	4	ligt geel, zonzijde goudgeel met een weinig rood vermengd, hier en daar ligt graauwe roest figuren.	Julij. August.	1 T.	Pyram.	Van de vroege Peren eene der uitmuntendste, draagt spoedig en veel.
52. Bon-Chrétien d'Automne. Herfst Bon-Chrétien.		Fig. 5, naar den steel eivormig afgerond, naar den kelk meer stomp eivormig.	5	ligt geelachtig groen, later iets meer geel, veel graauwe stippen, ook wel roestvlekken.	October. Novemb.	2 T.		Bij Knoop tab. 2, is de Herfst Bon Chrétien afgebeeld, wat echter de zomer Bon-chrétien zijn zal, naar de figuur, en vermoedelijk wel eender met die op tab. 1 (bij Knoop).
55. Bon Chrétien d'Eté. Zomer Bon-Chrétien. Sommer Apothekerbirne. Straszburgerbirne Malvasier. Suckeratenbirne. Graciale d'Eté. Graciale de Roma. Bosdurghan Armud. Turkenbirne.	Knoop tab. 2.  H. B. 67.  Nikita. Zuid-Tirol.	Fig. 9, naar den kelk dikker, en wat afgerond eenigzins hultig.	2	roevig goudgeel, zonzijde fraai rood overtogen, waarin donkere strepen, veel graauwe stippen, en eenigen roest, vooral bij den kelk.	Septemb. October.	5 T. 2 K.	Hoogst.	Bij Knoop tab. 2 als Herfst-Bon-Chrétien beschreven, dit is echter eene andere soort, zie boven 32.
54. Bon Chrétien Williams. William's Christbirne. Bon-Chrétien William's. William's Pear.	H. B. 405. C. L. 105. Journ. d. L. en	Fig. 11. naar den steel ingebogen, nog al veranderlijk in vorm, zeer hultig.	2	oudgeel, zonzijde sterk bruin gestipt en als met bruin overtogen, zelden een weinig dof rood, naar kelk en steel bruinen roest.	Septemb.	1 T.	Alle vormen.	Voor liefhebbers van gemuskeerde Peren eene uitmuntende soort.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKE BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Bartlett. Bartlett de Boston. Poire d'Angleterre (verkeerd). Salis. Davis Williams. Weeler Berkshire.	Annal. de Pom. 5—57.							
55. <b>Calebasse Carafon.</b> Calebasse Monstre. Calebasse Royal. van Marum.		Fig. 5, naar den steel niet altijd zo sterk ingebogen.		1. levig geelachtig groen, met veel donker bruinen roest overtogen.	Octob.	2 T. 1 K.	Alle vor- men.	Verlangt om de buitenge- wone grootte der vrucht be- schutte standplaats.
56. <b>Calebasse d'Été.</b> " (v. Esperen).	Annal. de Pom. 7—9.	Fig. 11, naar den steel iets ingebogen.		5. elachtig groen, met ligt bruine stippen en roestfiguren, om kelk en steel sterk beroest.	August. Septemb.	1 T.	Alle vor- men.	
57. <b>Calebasse musquée.</b> Venus-peer. Pijpzak of Pijpkam. Feigenbirne. Hospitalslemmer. Calebasse. Calebasse de Hollande. Beurré de Payence.	Knoop, tab. 3. M. v. Noordt. Overijssel. Holstein en Denemarken. Zweden. C. L. 127.	Fig. 5, naar den kelk meer rond toeloo- pend, zeer bultig en onregelmatig.		5. derkleurig bruin, aan de zonzijde soms donkerrood overtogen. veel bruinen roest.	Septemb. October.	1 T. of 2 T.	Alle vor- men.	
58. <b>Colmar.</b> Colmar incomparable. Roskammer. Poire Manne. Die Colmar. Belle et bonne. Manna-peer. Colmar. d'Auch. Colmar d'Orée. Colmar ancien. Paradiesbirne. Winter Pommeranzenbirne.	Knoop tab. 8. M. v. Noordt. Annal. de Pom. 4—67. H. B. 567.  C. L. 150.	Fig. 5, naar den steel wel eens ingebo- gen stomp afge- rond, naar den kelk ook wel eens ke- gelvormig afge- rond, nog al bul- tig en onregelma- tig.		2. elachtig groen, zelden iets roods, veel fijne graauwe stippen, en hier en daar eenig roest.	Decemb. Febr.	2 T.	Leib.	Verlangt een n zeer warmen standplaats en goede grond.
59. <b>Colmar d'Arenberg.</b> Fondante de Jallard. Poire Pomme de Terre. Arenbergs Colmar. Kartoffelbirne.	An. d. P. 5—5. C.L. Supp. 150. Journ. de Lyon H. B. 515.	Fig. 6, naar den steel ook wel eens inge- bogen, zeer bultig.		5. droengeel, met veel donker bruin- grauwen roest overtogen en ge- stipt.	Novemb. Decemb.	1 T.	Pyram. en Leib.	
40. <b>Crassane Althorp.</b>	C. L. 165.	Fig. 5, naar den steel eivormig toeloo- pend, naar den kelk kleine ribben.		5. roenachtig droevig geel, met ligt bruinen roest, vooral aan kelk en steel, ook wel roestfiguren.	October. Novemb.		Alle vor- men.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
41. Cuisse Madame. Poire de Rives. Poire de Fuscé.	Knoop Tab. 5.	Fig. 12, doch altijd korter.	3.	grijsachtig geel, aan de zonzijde grijs karmozijn rood overtogen, waarin donkerder vlammen, weinig roest.	August. Septemb.	1 T.	Alle vormen.	Zeer kenbaar in den groei der boomen, de takken zijn eigenaardig donker bruin met purperkleurigen gloed, groeit sterk; met Cuisse Madame bestaat in in het buitenland veel verwarring, waarom wij zonder nader onderzoek niet meer beschrijven konden, dan deze onze oude bekende soort.
42. Diamantpeer, graauwe.		Fig. 2.	4.	grijsachtig groen met veel graauwe stippen, en roest vooral bij kelk en steel.	Septemb. October.	5 T.	Hoogst.	
43. De Bavay (van Mons.)		Fig. 11, naar den steel en naar den kelk eivormig afgerond.	3.	grijsachtig groenachtig geel, zonzijde meer goudgeel, ligt graauwe roest en vooral om den kelk en steel.	Septemb.	2 T.	Pyram.	
44. Doyen Dillen (van Mons.) Dechant Dillen.	An. de P. 4-27. H. B. 91.	Fig. 11, naar den steel iets ingebogen en naar den kelk meer afgerond.	2.	grijsachtig groen, zonzijde iets rood bruin gestipt, eenig roest bijna over de geheele vrucht.	October. Novemb.	1 T.	Pyram. Leib.	
45. Doyenné Sieulle. Die Sieulles Birne.	C. L. 205. H. B. 517.	Fig. 4, iets hooger, naar den kelk meer afgerond.	3.	roengeel, zonzijde ligt rood gedeelt, en zeer fijn gestipt, om den steel een weinig roest.	October. Novemb.	1 T.	Pyr. en Leib.	
46. Duchesse d'Angoulême (Audusson) Herzogin von Angoulême. Poire des Eparonnais. Poire des Pézenas. Duchesse.	An. d. P. 1-21. H. B. 155.  C. L. 207. Journ. d. Lyon.	Fig. 5, naar den steel langwerpiger afgerond, naar den kelk iets kegelvormig, toeloopend, zeer bultig en ribachtig.	1.	grijsachtig geel, ook wel ligt roengeel, met veel bruine stippen en roestfiguren.	Novemb.	1 T.	Alle vormen.	Verlangt, om de buitengewone grootte der vrucht, eene beschutte standplaats.
47. Forellen peer. Forellen Birne. Poire Truites. Aux Truites. Grain de Corail.	H. B. 137. C. L. 255.	Fig. 11, naar den steel aan de eene zijde meestal ingebogen, wel iets veranderlijk.	2.	roengeel, met glanzend bruin rood, ook wel karmozijnrood, aan de zonzijde veel graauwe stippen, en bruinroode roestvlekken en figuren.	Novemb. Decemb.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Groeit sterk, kan het snoeien slecht verdragen, draagt op lateren leeftijd overvloedig.
48. Jalousie de Fontenay. Jalousie de Fontenay Vendée.	Journ. d. Lyon.	Fig. 11, altijd regelmatig gevormd.	2 en	grijsachtig geel, zonzijde bronskleurig, met veel graauwen roest overtogen.	Septemb. October.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer aan te bevelen, uitmuntende vrucht.
49. Juttepeer. Die Gute Graue. Grise bonne. Graue Sommer butterbirne. Holländische Sommer Dechantsbirne. Fondante Batave. Yat, Yutte.	M. v. Noordt. H. B. 39.  C. L. 441.	Fig. 14, altijd kort en naar den steel ingebogen, spitsachtig afgerond, naar den kelk iets afgerond, kelk vlak liggend.	4.	grijsachtig graauw, met veel graauwen roest, en stippen bedekt, aan de zonzijde somtijds iets bruinrood overtogen, ook wel met witte stippen voorzien.	Septemb.	1 T.	Hoogst.	Moet weinig gesnoeid worden, draagt op het einde der jonge takken.
50. Joséphine de Malines (Esperen).	Journ. d. Lyon. An. d. P. 2-5.	Fig. 6, naar den steel ingebogen naar de kelk iets afgerond.	4.	grijsachtig geel, met weinig roest aan de zonzijde, veel graauwen roest over de geheele vrucht.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram. Leib.	Verlangt, bij goeden grond, eene zeer warme standplaats voor eenen muur.



NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.
51. <b>Louise bonne</b> (Duhamel). Joden Suikerpeer. Smousenpeer.	Knoop tab. 7.	Fig. 10. minder ingebogen, naar de kelk regelmatig gerond.
52. <b>Maagdenpeer.</b>	M. v. Noordt.	Fig. 6 naar den steel wat ingebogen spit toeloopend, naar kelk regelmatig gerond.
53. <b>Mouille bouche d'Été.</b> Runde Mundnetz Birne. Poire de Bouchet. Beurré blanc d'Été. Mouille bouche runde. Runde Sommer Mundnetzbirn. Bergamotte d'Été. Comtesse de Lunay. Doyenne doré et Musquée. Milan blanc. Milan de Beuvrière. Franc Réal d'Été. Girardine à Bourdeaux. Colmar Bonnet. Clara.	H. B. 45.  Frankrijk.  Journ. de Lyon.	Fig. 8 ook wel iets hooger.
54. <b>Médaille d'or.</b> Die Herbst Sylvester.	An.d.Pom.1-91 H. B. 101.	Fig. 5. doch naar de steel meestal spit ingebogen toeloopend.
55. <b>Muscat Royal.</b> Sommer Robine. Robine d'Été. Muscat d'Août, d'Avernat. Poire Royale, Poire d'Honville. Robine Musquée, Gros-Muscat d'Été. Royale d'Août, Royale Musquée. August Musquée Pean. Musc Robine Pear. Königsbirn, Königliche Sommerbirn. Königliche Sommer Muscateller. August Muscateller. Groszvater.	H. B. 45.	Fig. 2 naar den steel iets ingebogen spit toeloopend, naar de kelk eivormig afgerond.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOONVORM.	OPMERKINGEN.
gelachtig groen, vol grijsgroene stippen, om den kelk somtijds eenigen roest.	Novemb. Januarij.	2 T. 2 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer verschillend in hoedanigheid, hangt veel af van warmten zoner en goede standplaats.
neelkleurig, schaduwzijde iets geelachtigs.	Sept.	2 T.	Hoogst.	Vruchtbaar.
gelachtig groen, met kleine grijsgroene stipjes. zeer weinig roest.	August. Sept.	1 T.	Hoogst. Pyr.	De onder dezen naam bij Knoop beschreven peer is de Poire Madame.
oud geel, met iets groen gemengd, zonzijde fraai rood overtogen en gevlekt, veel bruine stippen, vooral om den kelk.	October.	1 T.	Pyr.	De Médaille d'Or is volgens Journal de Lyon in Frankrijk als Frédéric de Wurtemberg, en Beurré de Montgeron bekend; C. L. Supp. 323 als Napoleon, doch dit is mede verkeerd. Er bestaat bij inzage van Fransche en Duitse Pomologische werken veel verraaring tusschen de Médaille d'Or en Frédéric de Wurtemberg.
gelachtig groen, aan de zonzijde fraai rood overtogen en gevlamd, met veel graauwgroene stippen over de geheele huid, roest om kelk en steel, de kelk open vlak liggend, om den kelk kleine ribbetjes.	August.	2 T.	Hoogst. Pyr.	De Robine bij Knoop tab. 3, is eene andere vrucht.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR AVELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<b>56. Napoleon.</b> Napoleons Butter-Birn. Die grosze grüne Mailanderin. Bon-Chrétien Napoleon. Poire Liard, Poire Medaille. Poire l'Empereur. Captif de St. Hélène. Bonaparte. Gloire d' l'Empereur. Charles X. Belle Canaise. Mabilie.	C. L. 525. H. B. 159.  Annal. de Pom. 5—27.	Fig. 11, naar den steel meer breed, en een weinig ingebogen, om den steel afge- rond, naar den kelk ook wel eens meer afgerond, bultigen zeer veranderlijk.	3.	glachtig glanzend groen met veel fijne bruine stippen, om den steel somtijds roest, ook wel roest- vlekken.	October. Novemb.	1 T.	Alle vor- men.	De C. L. 333 geeft ook de Synoniem Roi de Rome, dit is echter volgens de Annales de Pom. 7—51 eene andere vrucht.
<b>57. Passe Colmar.</b> Die Regentin. Colmar épineux. Passe Colmar gris. Passe Colmar gris dit Précél. Précél, Fondante de Paniselle. Fondante de Mons. Colmar d'Hardenpont. Ananas d'Hiver. Présent de Malines. Marotte Sucrée Jaune. Souveraine d'Hiver. Colmar Souverain. Pucelle Condésiense. Colmar d'Orée, Colmar Prent. Chapmans. Beurré d'Argenson.	C. L. 559. H. B. 163. An.d.P. 2—51. Journal de Lyon.	Fig. 6, naar den steel meestal ingebog- en, ook wel aan groote vruchten naar den kelk meer afgerond, enkele ribben om den kelk.	3.	roevig groenachtig geel, ook wel iets roods, op de zonzijde veel roest vooral om kelk en steel, ook over de geheele vrucht ver- spreid.	Novemb. Decemb.	1 T.	Alle vor- men.	Verlangt voor Hoogst. eene warme standplaats.
<b>58. Passe Colmar d'Août.</b> Passe Colmar musquée d'Automne. Hardenpouts frühe Colmar. Passe Colmar, par Ms. Hardenpont.	C.L.Suppl.559. H. B. 51.	Fig. 11, naar den steel meer ingebogen spits toeloopend.	4.	roevig groenachtig geel, met iets roods aan de zonzijde, groen- graauwe stippen, en fijnen roest.	August. Septemb.	1 T.	Hoogst. Pyram.	
<b>59. Prevost.</b>	An.d.P. 6—85. G.L.Suppl.552.	Fig. 2, naar den steel meer rond spits toeloopend.	4.	blondgeel, zonzijde fraai rood, met veel ligt bruine stippen en roest over de geheele vrucht.	Maart. April.	2 T.	Pyram. Leib.	Zeer vruchtbaar.
<b>60. Perzik peer, lange groene.</b>		Fig. 10.	3.	wasgroen, bij volle rijpheid iets ligter groen met veel kleine graauwe stippen.	Septemb. October.	2 T.	Hoogst. en Pyr.	
<b>61. Perzikpeer, ronde.</b> Deutsche National Bergamotte. (vermoedelijk). Dubb. Oranje-peer. Double Orange. Poire Pêche.	H. B. 87.	Fig. 4.	3.	ligt geelachtig groen, zelden iets rood, zonzijde meer geel, kleine graauwe stippen over de geheele vrucht.	Septemb. October.	2 T.	Hoogst. en Pyr.	De huid laat zich bij volle rijpheid, als bij eene Perzik, af- trekken; heeft zelden een kern- huis en zeer weinig pitten.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<b>62. Poire Madame.</b> Brusselsche Peer. Madame de France. Lange Lijsje. Beau présent d'Été. Epargne. St. Samsou. Grosse Cuisse Madame. Jargonelle (Engelsche). St. Lambert. Kaiserinn grosze. Die Sparbirne (vermoedelijk).	Knoop Tab. 1. Noordbrabant. Annal. de Pom. 1—115. C. L. 285. Deneimarken. Holstein. H. B. 195.	Fig. 12.	5.	stroengeel. zonzijde somtijds wat rood gevlekt, weinig roest meest bij den steel.	August.	1 T.	Hoogst. Leib.	Groeit snel, de jonge takken zijn veelal afwijkend krom, het blad is groot, lange bladstelen; zeer eigendommelijk gewas.
<b>65. Poire Seigneur.</b> Graauwe Poire Seigneur. Graue Dechantsbirn. Doyenne Gray. Doyenné Gris. Red. Doyenné. Gray Dean's. Doyenné Rouge. Doyenné Galeux. St. Michel Doré. St. Michel gris. Vergoldete Weisze Butterbirn. Beurré Brun. Doyenné Crotté. Doyenné Galeux. St. Michel Crotté. Philippe Strié.	H. B. 155. C. L. 199. Journ. d. Lyon. Annal. de Pom.	Fig. 5, meer kort, en naar den steel meer spits afgerond.	5.	roevig geel, zonzijde bruinachtig rood, de geheele vrucht met kaneelkleurigen roest overtogen, vooral bij kelk en steel sterker beroest, heeft in het aanzien eene bronskleur.	October. Novemb.	1 T.	Pyram. Leib.	De Doyenne Roux, beschreven in de Annales de Pom. 1—77 is niet dezelfde; het H. B. 135 geeft ook de Synoniem Beurré Roux, dit hoort echter bij den Beurré gris d'Aut. te huis, zie aldaar; ook is de bij M. van Noordt beschreven graauwe Herfst Beurre, niet anders dan de Poire Seigneur; deze soort is veel beter dan de blanke Beurre.
<b>64. Rousselet Musqué.</b> Rousselette de Rheims. Rousselet petit. Rousselet von Rheims. Franzosenbirn.	Knoop Tab. 5. C. L. 568. Journ. de Lyon. H. B. 77. An.d.P. 1—97.	Fig. 11, iets ingebogen naarden steel, en stomp spits toeloozend.	4.	geelachtig groen, zonzijde fraai donker bruin rood overtogen en gevlamd, graauwe stippen over de geheele vrucht.	Septemb.	1 T.	Hoogst. Pyr.	
<b>65. Rousselet de Stuttgart.</b> Stuttgarter Geishirtel. Diel's langstiellige Geishirtel.	H. B. 47.	Fig. 11, iets meer ingebogen naar den steel, en spits toeloozend.	4.	ligt geelachtig groen, zonzijde bloedig rood overtogen, met veel roest, vooral om kelk en steel.	August. Septemb.	1 T.	Hoogst. Pyr.	
<b>66. Saint Germain.</b> Inconnue de la Fare. Die St. Germain. St. Germain gris. St. Germain Jaune. Poire d'Arteleoire. Unknown of the Fare. Hermanns birne.	Knoop Tab. 8. M. v. Noordt. H. B. 555. C. L. 572. Journ. d. Lyon. Oberdieck's Anleitung.	Fig. 10, minder ingebogen naar den steel, naarden kelk veelal ronder, zeer bultig en onregelmatig, ribben om den kelk.	2.	leek geelachtig groen, zonzijde iets geel, veel graauwen roest en stippen, vooral om den kelk.	Decemb. Jan.	1 T.	Leib.	Verlangt eene warme standplaats, liefst voor eenen muur.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR AVELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<b>67. Seckel pear.</b> Seckels Birn. Seckel. New York Red Cheek. Red Checked Seckel. Sickels Birn. Rothbackichte Sikelbirn. New Yorker Rothbacken. Shakespeare.	H. B. 117. C. L. 590.  C.L. Supp.590.	Fig. 2, naar den steel iets meer toeloo- pend, ook wel een weinig ingebogen.	4.	Groenachtig geel, bijna geheel met rood-bruine vlammen en streep- en, is veelal geheel met dikken graauwen roest overdekt.	October.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Groeit niet hard, draagt veel, kan het snoeien slecht vordragen, daarze aan het eind der jonge takken veeltijds vrucht geeft, uitmuntende vrucht meestal aan trossen bijeen.
<b>68. Seigneur (d'Esperen).</b> Esperens Herrenbirne. Bergamotte Fievée. Bergamotte Lucrative. Fondante d'Automne. Oberdieck's Butterbirnen. Fondante de Mabeuge.	H. B. 409. Journ. d. Lyon. An. de P. 7-5. C. L. 229.  De Jonghen.	Fig. 5, naar den steel eivormig, naar den kelk stomp eivormig afgerond.	5.	Melachtig groen, met fijne graauwe stippen, zonder rood, weinig verspreiden roest.	Septemb. October.	1 T.	Alle vormen.	Zeer aan te bevelen
<b>69. Soldat laboureur.</b> Blumenbach's Butterbirn.	An. d. P. 5-51. Journ. d. Lyon. H. B. 145.	Fig. 11, naar den steel iets ingebogen, naar den kelk stomp eivormig afgerond, zelden een weinig bultig.	2.	Roevig groenachtig geel, om kelken steel vele stippen en eenig roest.	October. Novemb.	2 T.	Alle vormen.	Uitmuntende tafelpaar.
<b>70. Suikerpeer, Fransche.</b> Graauwe Suikerrijpeer.	Knoop Tab. I.	Fig. 8, naar den steel spits, ingebogen toeloo- pend, naar den kelk stomp afgerond.	4.	Groengeel met veel graauwen roest, zelden iets roods.	Septemb.	2 T.	Hoogst.	
<b>71. Suikerpeer, Noordholland- sche.</b> Fransche Suikerpeer. Dubbelde Suikerpeer.	Noordholl.	Fig. 5, naar den steel wat ingebogen toeloo- pend.	5.	Melachtig groen, zonzijde meer geel, veel groote graauwe stippen.	Septemb. October.	2 T.	Hoogst.	
<b>72. Suikerpeer, vroege.</b> Honigpeer. Perl-Zucker. Vroege Suikerrij.	Knoop Tab. I. M. v. Noordt.	Fig. 2, iets langer, naar den steel eivormig toeloo- pend, kleiner dan de Fransche Suikerpeer.	4.	Roodgeel, zonzijde fraai rood over- togen.	Julij. August.	2 T.	Hoogst.	
<b>75. Triumph de Jodoigne.</b> Triumph von Jodoigne. Triomphe de Jodoigne.	H. B. 547.	Fig. 14, naar den steel ingebogen toeloo- pend, naar den kelk eivormig afgerond.	2.	Melachtig groen, de zonzijde ei- groengeel, graauw bruine stippen, en roest vooral bij kelk en steel.	Novemb.	1 T.	Alle vormen.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<b>74. Verte Longue.</b> Lange grüne Herbstbirn. Mouille bouche d'Automne. Muscat Fleuré. New Autumn. Herbst Wasserbirn. Lange Grüne Mundnetzbirn. Lange Grünbirn. Späte Glasbirn. Grüne Melonenbirn. Schmeckerin. Herbstsaftbirn. Slakpeer.	Knoop tab. 6. H. B. 114. C. L. 420.  Westland.	Fig. 9. doch naar den steel minder ingebogen, naar den kelk regelmatig afgerond.	3.	geelachtig groen met veel fijne stippen, weinig roest, in natte jaren veel zwarte roestvlekken.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
<b>75. Verte longue, bonte.</b> Zwitsersche broekpeer. Liverij-peer. Poire Brodée. Verte Longue Panachée. Schweizer hoge. Suisse. Culotte Suisse. Mouille bouche Panachée. Bergamot Suisse longue.	M. v. Noordt.  C. L. 424. H. B. 112. Annal. de Pom. 1—63. Knoop tab. 5.	Fig. 9. doch naar den steel minder ingebogen, naar den kelk regelmatig afgerond.	4.	Als de «Verte Longue.» doch met fraaije, geel met roode bandstrepen, over de geheele vrucht regelmatig afgezet.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
<b>76. Virgouleuse.</b> Die Virguleuse. Virgoulée. Chambrette. Bujaleuf. Poire de Glacé. St. Leonard. Besi de Virgoulée. La Borie. Paradies Birne. Kalmes, Glanz und Franzosen birn. Grüne Winter Bergamotte. Lange Grüne Bergamotte. Kurzstielige Bergamotte. Winter Citroni.	H. B. 535. C. L. 427.  Zuid-Duitschl.  Tirol.	Fig. 6. naar den steel meestal eene kleine inbuiging, en stomp afgerond, naar den kelk regelmatig rond, eivormig afgestompt ook wel iets langer, kelk vlakliggend open.	5.	geelachtig groen, zonzijde somtijds iets bruins, fijne graauwe stippen om kelk en steel, veel bruin-graauwen roest, somtijds zwarte roestvlekken.	Novemb. Decemb.	2 T. 1 T.	Alle vormen.	Hier te lande het meest voor Leib, aan te bevelen, in Duitschland zeer gezocht.
<b>77. Vijgepeer.</b> Hollandsche Feigenbirne. Poire Figue. Gürkenbirn, Fregattbirn. Hopfenbirn. Kaiserinnbirn. Figue. Pistolette, Prince de Ligny.	H. B. 75. N.-Duitschland.  Holstein. C. L. 157.	Fig. 11. zelden iets ingebogen, zeer regelmatig.	2.	roevig geelachtig groen, meestal aan de zonzijde dof bruinrood overtogen, veel graauw groene stippen overal verspreid, alsmede eenige ligte roest.	Septemb. October.	1 T.	Alle vormen.	Bij Knoop is in het register de Syn. Poire Figue bij de Poire Madam vermeld, dit is verkeerd. — Voor Pyr. en Leib niet geschikt dewijl de boom het snoeien niet kan verdragen, de vrucht moet niet te boomrijp worden, daar ze dan den smaak verliest.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTTE.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Inconnue Angoulême. Knevelt's. Grüne Flaschenbirn. Rougemont. Doppelte Feigenbirn.	Denemarken.							
78. <b>Zotte belle.</b> Fransche zottibel. La Sonnette. Citroenpeer. Die Französische Muscatelle. Französische Süsze Muscatelle. Die Fransche Soete Belle.	M. v. Noordt. Noord-Brabant. H. B. 251.	Fig. 4, somtijds naar den steel iets ingebogen, naar den kelk regelmatig afgerond.	4.	Helder geelachtig groen, somtijds citroengeel, bezaaid als met groene stippen.	Septemb.	5 T.	Pyram.	Vruchtbaar.
<b>PEEREN UITSLUITEND VOOR DE HUISHOUDING (KEUKEN.)</b>								
79. <b>Baronpeer.</b> Barons birne.	H. B. 355.	Fig. 6. naar den steel wat ingebogen, en naar den kelk afgerond, kelk in diepe holte, bultige verhevenheden over de vrucht.	2.	Droevig geelachtig groen, fijne stippen over de geheele vrucht, en aan de zonzijde vooral met bruinen roest overtogen.	Jan. Maart.	2 K.	Hoogst.	Heeft om den kelk veel zwarte roestvlekken, die spoedig bederf veroorzaken, waarom ze ook wel Rotneus genoemd wordt.
80. <b>Dirkjespeer.</b> Dubbelde Dirkjespeer. Fondspeer. Milan d'Été. Diamant.	Noord-Holland. Overmaassen.	Fig. 2, doorgaans iets hooger.	4.	Mat geel, zonzijde meestal met bruinroode vlammen, en overtogen, om den kelk veeltijds ligt bruinen roest.	August. Septemb.	1 K.	Hoogst.	Uitmundende Peer in dit Seizoen vruchtbaar, op de markt zeer gezocht, houdt zich tamelijk lang goed.
81. <b>Dorothée Royale.</b> Double Dorothée.		Fig. 3, doch naar den steel meestal ingebogen, bultig over de geheele vrucht.	2.	Droevig geelachtig groen, met veel graauwen roest en stippen.	Decemb. Febr.	1 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar, de Beurro Diel heeft ook als Synoniemen deze namen, is echter zeer verschillend in smaak, hoewel ze uitwendig gelijken.
82. <b>Foppen peer.</b> Fasenbirn. Die Vexierbirne. Poire de la Force. Duc de la Force. Sirooppeer.	Knoop tab. 8. M. van Noordt.	Fig. 11, naar den steel meestal iets ingebogen, tamelijk spits toeloopend.	5.	Geel, somtijds goudgeel, zonzijde fraai glanzendrood overtogen, waarin meestal purper roode vlammen, over het geel veelal wat roest, ook om den kelk en steel.	Novemb. Jan.	1 K.	Hoogst.	Voortreffelijke vrucht, zeer mild dragend.
85. <b>Gratiolle, lange.</b>	M. van Noordt.	Fig. 12, naar den kelk dikker, bultig over de geheele vrucht, eenzijdig of scheef naar den kelk.	1.	Droevig groen met geel vermengd, zonzijde bruin rood, graauwe stippen.	Jan. Maart.	1 K.	Hoogst.	Verlangt om de groote vrucht beschutte standplaats.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE
84. <b>Gratirole, ronde.</b> Pondspeer. De Livre. Grand Monarch. Groote Mogol. Groote Tamerlan. Bonker peer.	Knoop, tab. 8.  Aan de Lek.	Fig. 7, naar den steel met eene kleine inbuiging een weinig spits toeloo- pend.	1.
85. <b>Kamper Venuspeer.</b> Kampervenus. Kamperpeer. Die Kamper Venus.	Knoop fol. 27.  H. B. 535.	Fig. 5, naar den steel weinig ingebogen spits toeloo- pend, naardenkelkstomp eivormig afgerond.	5.
86. <b>Louwtjes peer, winter.</b> Rosmarin-birne. Stergonette. Bellissime d'hiver.	M. v. Noordt. Knoop tab. 7.	Fig. 12.	5.
87. <b>Kleipeer.</b> Winter Suikerpeer. Winter Suikerijpeer. Weldrager. Winter gezegende peer.  Winter Jannetje. Brittenpeer. Kivietspeer. Mandjespeer. Jan-Groospeer.	Knoop tab. 7. Zeeland. Gorinchem en N.-Brabant. M. v. Noordt. Groningen en Vriesland.	Fig. 5, naar den steel flauw ingebogen, naar den kelk ei- vormig afgerond.	3. of 4.
88. <b>Rietpeer, dubbelde.</b> Zomer Rietpeer. Grosze Rietbirne. Rohn- oder Schilfbirn. Hasel- und Safferbirn. Angobert. Pannekoekspeer.	H. B. 251.  Saksen.	Fig. 12, over 't geheel veel dikker.	1.
89. <b>Rietpeer, Winter.</b> Silezie-peer. Winter Kraaipeer. Roggenbroodspeer. Winter Callebas, (ten onregte).	Zeeland. Westland. Utrecht.	Fig. 12, doch over 't geheel dikker, en regelmatiger dan de zomer rietpeer.	1.
90. <b>Witte Cousin.</b> Blanke Cousin. Bagijne peer. Pachters peer.	Overmaas. N. Brabant.	Fig. 11, naar den steel meestal ingebogen toeloo- pend, naar den kelk stomp ei- vormig afgerond.	2.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
roevig geelachtig groen, zonzijde meestal bruin rood overtogen, veel bruin graauwe stippen.	Febr. Maart.	1 K.	Hoogst.	Beschutte standplaats, op de markt zeer gezocht.
roevig citroengeel, zonzijde weinig ligt vuil rood, fijne graauwe stippen, roestig om kelk en steel, ook wel wat roest over de geheele vrucht.	Jan. Maart.	1 K.	Hoogst.	Zeer aan te bevelen.
leek groen met iets geel, zonzijde ligt bruin rood overtogen, vol kleine graauwe stippen.	Jan. Maart.	1 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar van uitmun- tende kwaliteit.
grauwachtig groen met veel asch- graauw, groote stippen en veel roest.	Decemb. Mei.	2 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar, gezocht op de markt, voor ruwe streken en zee-provincie's aan te be- velen, om te stoven minder goed, maar om ongeschild te kookken vooral bij den landman geliefd.
leelachtig groen, waarvan zelden iets te zien is, daar de vrucht geheel met kaneelkleurigen roest is bedekt, nog al grijze stippen hier en daar.	Septemb.	1 K.	Hoogst.	
leelachtig groen, waarvan zelden iets te zien is, daar de vrucht met kaneelkleurigen roest geheel overdekt is, de kleur is donkerder dan de zomer rietpeer.	Jan. Febr.	1 K.	Hoogst.	
ilachtig geel, met licht groen ver- mengd, een weinig bleek bruinen roest.	October. Decemb.	1 K.	Hoogst.	Groeit snel, zeer aan te be- velen, op de markt gezocht.

BESCHRIJVING

DER

VRUCHTSOORTEN.

UITGEGEVEN DOOR DE

„Vereeniging tot Regeling en Verbetering der Vruchtsoorten.”

TE BOSKOOP.

-----  
Tweede Reeks. — 1863.  
-----



TER DRUKKERIJ VAN  
G. B. VAN GOOR, te Gouda.



# APPEL SOORTEN.



Voor sommige uitdrukkingen bij het beschrijven ook van de  
Peren gebruikt, zie men het **VOORWOORD** in. bij de Eer-  
ste Reeks gevoegd. voor de Figuren de Tabellen.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE
101. <b>Ananas, blanke.</b> Tobias appel.	Overijssel, niet de soort, welke afgebeeld en beschreven is in de Annales de Pom. 7. p. 79.	Fig. 5. doorgaans iets hooger, om den kelk geribd, zeer onregelmatig.	3.
102. <b>Baldwin.</b> Red Baldwin. Butter's. Woodpecker.	C. L. 22. H. B. 427.  Ann. de Pom. 5—47.	Fig. 7. doorgaans iets platter en naar den kelk breede, ongelijke verhevenheden over de geheele vrucht.	5.
105. <b>Bellefleur, zoete late winter.</b>		Fig. 7. naar den steel meer kegelvormig.	3.
104. <b>Borsdorfer, Nikitaër winter.</b>	Oberdieck Anleitung, fol. 105.	Fig. 5, naar den kelk kleine ribbetjes, zeer lange dunne steel.	4.
105. <b>Calville, Brielsche.</b>	Eiland Voorne.	Fig. 5, niet zoo sterk geribd als de witte winter-Calville.	5.
106. <b>Cardinal de Juillet.</b>	Uit Frankrijk ingevoerd.	Fig. 5, doorgaans iets platter.	4.
107. <b>Cornish Aromatic.</b>	C. L. 181.	Fig. 5, met kleine verhevenheden over de vrucht.	2.
108. <b>Drap d'Or.</b> Goldzeug apfel. Vrai drap d'or. Reinette Joseph II. Donauers Reinetten-Rambour. Oberdiecks grosze gelbe Zucker Reinette.	H. B. 265. Duhamel. Duitschland.	Fig. 5, meest iets gedrukt.	2.
109. <b>Florianer-Rosenapfel.</b>	H. B. 451.	Fig. 7, naar den steel meer kegelvormig, om den kelk verhevenheden.	2 en 5

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Bleek geelachtig groen, zonzijde meer geel.	October.	2 T.	Hoogst.	Door den heer Serrurier uit Frankrijk ingevoerd, zonder naam, en door den heer Tobias te Zwolle, onder den naam van <b>Ananas, blanke</b> , in den handel gebracht.
Geelachtig, bijna geheel met droevig rood overtogen, zonzijde donkerder rood, meer gevlamd.	Jan. Maart.	5 T. 2 K.	Hoogst.	Vruchtbaar.
Goudgeel aan de zonzijde, en gedeeltelijk ook aan de schaduwzijde, fraai karmozijnrood gestreept en gevlamd.	Maart. April.	2 K.	Hoogst.	Goede handelsoort.
Groenachtig geel, zonzijde purperrood overtogen, met donkerder vrolijk roode vlammen, stervormige graauwe stippen.	Jan. Maart.	1 T.	Alle vormen.	Wordt zeer aanbevolen.
Geelachtig groen, zonzijde hooger geel, met iets droevig ligtrood gemengd, naar den kelk bezaaid met fijne graauwe stippen.	Decemb. Febr.	2 T.	Hoogst.	Levert aan hoogstamde bomen vruchten dan de witte winter-Calvil, voor de markt aan te bevelen.
Ligtgeel, bijna geheel met karmozijnrood overtogen, aan de zonzijde meer purperrood.	Julij. August.	1 T.	Pyr. en Leib.	Om den beteren groei der booms aan te bevelen boven de roode Zomer-Calville.
Geelachtig groen, zonzijde rood gevlamd, veel dunne, ongelijk verspreide, graauwe roest, ruw op 't gevoel.	Decemb. Jan.	1 T.	Pyr. en Leib.	
Groenachtig geel, zonzijde meer goudgeel, hier en daar ligte roestfiguren.	Novemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	Verlangt als hoogstamde vrucht standplaats; zeer geschikt om lanen wegen te planten.
Ligt groenachtig geel, bijna geheel met ligt karmozijnrood overtogen, aan de zonzijde met donker karmozijnroode strepen en vlammen.	Novemb. Decemb.	1 T.	Alle vormen.	Litmuntende vrucht, welke nog wel zoo geurig is als de met roem bekende Prinsesse-Nobel; afkomst de Abdij Sain-Florian, Traunkreits, in Oostenrijk.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
110. Golden Harvey (Ingramm's)?	C. L. 275.	Fig. 6, meer plat gedrukt.	4.	droevig groenachtig geel, zonzijde met ligtroode, somtijds bruinroode vlekken, bijna geheel met roest overtogen, t welk zich figuursgewijze zamentrekt.	Jan. April.	1 T.	Pyram. Leib.	Groeit teeder, uitmuntende soort.
111. Golden Harveys Pippin.		Fig. 7, in den regel niet zoo hoog.	4.	groenachtig geel, zonzijde met lichtrood en iets oranje, vlamachtig overtogen, veel roest, vooral om de steelholte, lange steel.	Jan. Maart.	1 T.	Pyr. en Leib.	Uit Engeland ingevoerd, de boom groeit matig.
112. Golden Noble. Gelber Edelpfel.	H. B. 577. C. L. 280.	Fig. 5, iets platter.	2.	ligt geel, op de zonzijde, meer goudgeel, zonder eenig rood, wit gele stippen in de huid.	October. Jan.	1 K. 5 T.	Hoogst.	Voor de markt aan te bevelen, zeer schoon en vruchtbaar.
115. Keizer tafelappel. Kaiser Tafelapfel.		Fig. 7, naar den steel iets kegelvormig.	5.	groenachtig geel, aan de zonzijde meest met ligt bruin rood overtogen.	Septemb. Novemb.	2 T.	Pyram.	Uit Duitsland ingevoerd.
114. Moscowiter Eisapfel. Konstantinopel-appel.		Fig. 5, naar den kelk meer platachtig afgerond.	5.	geelachtig groen, met ligt roode vlammen en streepjes.	August. Sept.	2 T.	Hoogst. Pyram.	Worlt in het Handbuch tot 87 als synoniem met de witte Astrachaner aangegeven. Er is evenwel verschil, doch kan door de witte Astrachaner wel vervangen worden.
115. Nieuwe Engelsche Pigeon. Neue Englischen Pigeon.		Fig. 5, in den regel hooger gebouwd.	2.	fraai ligt vermiljoen rood, aan de zonzijde meer purper, zelden een weinig geelachtig groen.	October. Febr.	1 K.	Pyram.	Prachtige zoete appel, een sieraad op t dessert, voor hoogstamde niet aan te bevelen.
116. Nonpareil. Braddick's. Ditton Nonpareil.	C. L. 465. H. B. 475.	Fig. 4, naar den kelk meer afgerond.	4.	geelachtig groen, aan de zonzijde met iets bloedig rood overtogen, veel kaneelkleurige roest, vooral om kelk en steel.	Decemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	
117. Nonpareil. Scarlet. New Scarlet Nonpareil.	C. L. 482.	Fig. 4, naar den kelk meer afgerond.	4.	droevigeel, zonzijde fraai rood overtogen, met karmozijn roode vlammen.	Decemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	
118. Pearmain. Claygate.	C. L. 558. H. B. 549.	Fig. 5, in den regel iets hooger.	4.	groenachtig geel, aan de zonzijde iets rood, een weinig streepachtig, met veel roest overtogen, ruw op het gevoel.	Decemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	Zeer aan te bevelen; is draagzaam.
119. Pearmain d'Hiver.		Fig. 4, in den regel iets hooger.	5.	had, goud geel, zonzijde fraai lachend rood overtogen, waarin enkele donkerder roode strepen, enkele fijne zwarte stippen vooral in het geel.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vormen.	Onderscheidt zich van de Engelsche Winter Goud-Pearmain dat zijne huid niets bitterachtig heeft. In den regel is deze appel ook kleiner, de huid is altijd gladder. Voortreffelijke soort; moet niet verward worden met den Carmeliter Reinete H. B. 161.
120. Pearmain. Herefordshire. Old Pearmain.	C. L. 544.	Fig. 6, naar den steel meer kegelvormig.	5.	geelachtig droevig groen, aan de zonzijde weinig droevig ligt bruin	Jan. Mei.	1 T.	Alle vormen.	Zeer vruchtbaar.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Pearmain. Royale d'Angleterre.		de kelk in wijde schotelvormige holte, matig diep ingezonken, enkele verhevenheden om de kelkholte, de kelk wijd open.		rood, somtijds vlamachtig, ook wel als eene vlek voorkomende, hier en daar dunne verspreide roest.				
121. Pearmain. Scarlet. Bell's scarlet. Oxford Peach. Scharlachrothe Parmäne.	C. L. 558. H. B. 515.	Fig. 7 meest iets platter, en naar den kelk breeder.	5.	ligt geel, bijna geheel met helder karmozijn rood overtoegen en aan de zonzijde donkerder gevlamd en gestreept.	Septemb. October.	1 T.	Alle vormen.	Zeer fraai en uitmuntend van smaak.
122. Pippeling, Cambusnethan. Winter Red Streak. Watch apple. Cambusnethan Apfel.	C. L. 120. H.B. 4ten Band fol. 89.	Fig. 1. meest iets hooger.	5.	ligt geel, aan de zonzijde meer roodachtig geel, waarin fraaije ligt roode kleine vlammen en streepjes.	Novemb. Jan.	2 T. 2 K.	Hoogst.	
123. Pippeling, gele Lavendel. Gelber Lavendel pepping.	H.B. 4ten Band fol. 115.	Fig. 5, naar den kelk iets platter, de kelk een weinig ingezonken, omringd van kleine ongelijke verhevenheden.	4.	troengeel, zonzijde goudgeel, hier en daar fijne graauwe stippen.	August. Septemb.	1 T.	Alle vormen.	Is zeer geurig, van daarden naam.
124. Pippeling, Parker's.	H. B. 559.	Fig. 5, doch iets platter.	4.	troengeel, bijna geheel overtoegen met kaneelkleurige roest.	Decemb. Maart.	1 T.	Alle vormen.	Zeer vruchtbaar.
125. Pippeling Ribston Glory of York. Formosa pippin. Travers's. Ribston Pepping. Englische Granatreinette. Travers-Reinette.	C. L. 704. H. B. 555. Annales de Pom. 5 fol. 15.	Fig. 5, naar den kelk iets breeder afgerond, ongelijke verhevenheden over de geheele vrucht; om den kelk een groen kransje of ringetje.	5.	Bijna goudgeel, zonzijde fraai rood karmozijn gevlamd, om den kelk en steelholte veel roest, weinige stippen; in vele jaren is het rood minder zichtbaar.	Decemb. April.	1 T.	Alle vormen.	Schoone en zeer aanbevelenswaardige soort; zeer vruchtbaar.
126. Pippeling, Rothbackige Winter. Rothbackige Winter-Pepping.	Oberd. Anlei- tung fol. 161.	Fig. 4, eenige vlakke verhevenheden over de geheele vrucht.	4.	ligt geelachtig groen, aan de zonzijde somtijds met iets bruinrood overtoegen, veel ligt graauwe roest, ongelijk verspreid over de geheele vrucht.	Jan. April.	1 T.	Alle vormen.	Zeer vruchtbaar, verschilt met de Herwegs-Reinette door ligter gekleurde huid, en nog wel zoo smakelijk fijner vleesch; het onderscheid echter gering.
127. Pippeling, Spaansche. Spanische Pepping.	Oberd. Anlei- tung fol. 162.	Fig. 7, somtijds ook wel iets lager.	4.	oudgeel, aan de zonzijde met fraaije ligt roode vlammetjes en stippen, bij de steelholte iets groenachtig graauw, om den kelk kleine graauwe stipjes, als stof gezaaid.	Jan.	1 of 2 T.	Alle vormen.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
128. Present van Engeland. Heerappel.	Overijssel.	Fig. 9, naar den steel meestal kegelvormig.	2.	groen geel, aan de zonzijde met licht bruin rood overtogen, kleine grijze stippen.	Novemb. Jan.	5 T. 2 K.	Hoogst.	
129. Present Royal.		Fig. 5, naar den kelk breeder, en meestal hooger.	1.	groengeel, zonzijde iets rood gevamd, weinig kleine witte stippen.	Novemb.	2 K.	Hoogst.	Een der grootste appelen tot heden bekend, verlangt beschutte standplaats.
150. Reinette Ananas. Ananas Reinette.	H. B. 451.	Fig. 6, naar den kelk meer rond toeloo- pend, om den kelk kleine ribben.	4.	groen geel zonzijde hoog goud- geel, stervormige roestige stippen, regelmatig verdeeld.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyr. en Leib.	Voor hoogstammen verlangt deze soort beschutte stand- plaats, zeer aan te bevelen. fraaie regelmatige vrucht.
151. Reinette. Baumanns. Baumanns Reinette. Baumanns rothe Winter Reinette. Couronne des Dames.	H. B. 485.  Enghien.	Fig. 5, doch iets meer plat gedrukt.	5.	rood geel, bijna geheel met leven- dig rood overtogen, aan de zon- zijde vooral karmozijn roode vlammen en strepen, bij den kelk een weinig roest.	Decemb. April.	1 T.	Alle vor- men.	Zeer schoone vrucht; voor den handel aan te bevelen.
152. Reinette. Dietzer Goud. Dietzer gold Reinette Dietzer Winter gold Reinette. Reinette d'Orée de Dietz.	H. B. 509.  Societeit van Mons.	Fig. 4 ook wel Fig. 6, om den kelk zeer kleine ribben.	4.	oud geel, aan de zonzijde fraai helder rood gestreept, hier en daar eenige licht graauwe roest, vooral om kelk en steel.	Decemb. April.	1 T.	Alle vor- men.	
154. Reinette. Dietzer Amandel. Mandel Reinette.  Dietzer rothe Mandel Reinette.	H. B. 4ten Band fol. 145.	Fig. 5, de kelk bijna vlak liggend, met kleine ribbetjes stervormig om- geven.	4.	velachtig groen, aan de zonzijde droevig bruinrood overtogen, met eenige vlamachtige streepjes, we- nig graauwe stippen en versprei- den roest.	Decemb. April.	1 T.	Alle vor- men.	
155. Reinette Muskaat. Muskat Reinette. Margil. Never Fail. Munche's Pippin. Small Ribston. Kleine Granat Reinette Neue Muscat Reinette.	H. B. 145.  C. L. 428.  Oberdieck, Anl. 195.	Fig. 5, naar den kelk, spits rond toeloo- pend, ongelijke ver- hevenheden over de geheele vrucht, om den kelk kleine ribben, aan den steel veelal een uitwas.	4.	droevig citroen geel, bijna geheel met roode streepjes en vlammen, aan de zonzijde meer karmozijn rood gevamd en gestreept, de kelk eigenaardig met licht graau- wen roest omgeven.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vor- men.	Minder als leiboorn, op eene warme plaats aan te bevelen. de vrucht wordt dan spoedig melig.
156. Reinette Granville. Reinette Grise de Granville.	C. L. 667.	Fig. 7, doorgaans iets korter, en naar den kelk meer spits- rond toeloo- pend.	4.	rood geel, bijna geheel met licht kaneel- kleurigen roest dun bedekt, enkele zwarte roest-figures, somtijds.	Novemb. Febr.	1 T.	Alle vor- men.	Verlangt eene nog al warme standplaats, bij eenen niet al te droogen grond. De Pariser Ram- bour, gaat ook voor Reinette Granville, dit is echter een verkeerde Synoniem van die soort. Zie H. B. fol. 119.
157. Reinette Gris de Canada. Russet Royal. Passe-pomme du Canada. Reinette du Canada grise.	C. L. 749.	Fig. 2, in den regel hooger, en naar den kelk minder spits toeloo- pend, den	4.	rood geelachtig groen, bijna geheel overdekt met donker bruin- graauwen roest, waarin duidelijk grijze stippen zichtbaar zijn, om	Jan. Mei.	2à5 T.	Hoogst.	Ook deze soort wordt door vele uitlandsche Pomologen met de Pariser Rambour ver- ward, zie H. B. fol. 119.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Kleur.	GROOTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVOEM.	OPMERKINGEN.
Reinette du Canada platte. Leathercoat.		kelk gesloten, in kleine holte.		den kelk meestal een weinig groen.				
158. Reinette Grüne. Alter Nonpareil.	H.B. 4ten Band, fol. 155. Ann. de Pom. 4, fol. 55.	Fig. 4. naar den kelk iets meer spits-rond toeloopend, den kelk in eene kleine en ondiepe holte.	4.	oenachtig geel, zelden iets roods aan de zonzijde, als het voorkomt is het bruinrood, weinig dunnen verspreiden roest.	Decemb. April.	1 T.	Alle vormen.	Deze soort moet niet verward worden met de Reinette Fransche zie N <sup>o</sup> . 76.; noch met Reinette Nonpareil, zie N <sup>o</sup> . 81, ook niet met Reinette Verte, zie N <sup>o</sup> . 85 eerste Reeks.
159. Reinette, Herrweg's.  Herrwegs Reinette. Herwegs Weisze Reinette.	H.B. 4ten Band, fol. 125.  Oberd. Anl. 188.	Fig. 4. bijna onmerk-bare verhevenheden over de geheele vrucht.	4.	igt groen, iets geelachtig, zelden iets bruinrood aan de zonzijde, veel ligt graauwen roest, bijna over de geheele vrucht.	Jan. April.	1 T.	Alle vormen.	Zie voor deze soort N <sup>o</sup> . 126, ter vergelijking.
140. Reinette. Landsberger. Landsberger Reinette.	HB. 4ten Band, fol. 151. Oberdieck Anl. 191.	Fig. 5, naar den kelk breeder en hooger, is ook wel minder geribd.	2.	oenachtig geel, aan de zonzijde fraai met streepachtig bruinrood overtogen, fijne bruinachtige met wit omringde stippen in het gele.	Novemb. Decemb.	5 T. 1 K.	Hoogst.	Voor de markt aan te bevelen.
141. Reinette la Reine.		Fig. 5, rond den kelk kleine ribben.	5.	igt geel, aan de zonzijde een weinig ligt rood, wat vlamachtig, kleine graauwe stippen, weinig of geen roest.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst.	Moet niet verward worden met Reine des Reinettes, de syn. van den Engelschen winter Goud-Pearmain zie N <sup>o</sup> . 51.
142. Reine de France.		Fig. 10. naar den kelk meer afgerond, even zoo naar den steel, de kelk groot wijd open, in groote vlakke holte, met kleine ribben omgeven.	2.	igt geelachtig groen, wordt later meer goudachtig geel, en aan de zonzijde goudgeel, hier en daar kleine stippen, zeer weinig dunnen roest vooral aan den steel.	October. Novemb.	1 T.	Alle vormen.	In de omstreken van Tiel in den tuin van eenen dorpspredikant staat de moederboom; de vrucht is tot op dit oogenblik met geen andere soort over een te brengen
143. Sire de Fauquemont.		Fig. 6. somtijds nog hooger, ook wel iets platter en dan tevens meer breed, de kelk in vlakke holte.	4.	igt geelachtig groen, somtijds hoog geel, en dan fraai rood gestreept en gevlamd, meestal geheel bedekt met ligt grijzen roest, vooral dan, als de soort op Paradijs veredeld is.	Decemb. Jan.	1 T.	Pyr. Leib.	Uitmundende fijne dessert-appel.
144. Stettiner, roode. Rother Stettiner. Rother Herrenapfel. Annaberger. Berliner Glasapfel. Bödighheimer. Rother Bietigheimer. Tragamonen.	H. B. 553.      Württemb. Ulm.	Fig. 4. naar den kelk meer spits afgerond, vlakker verheven over de vrucht.	3.	elachtig groen, de zonzijde met bloedig rood overtogen, waarin fijne wit groene stippen.	Jan. April.	1 K.	Hoogst.	Als marktvrucht aan te bevelen, ook omdat deze vrucht zich goed laat transporteren.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in :	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<p>Rohter Zwiebelapfel. Mahlerapfel. Rothvogel.</p> <p>145. Schoone van Boskoop. Belle de Boskoop.</p>	<p>Baden, etc. Oostenrijk. Pfaltz.</p> <p>In Boskoop gewonnen.</p>	<p>Fig. 3, naar den kelk meer plat afgerond, ook wel Fig. 4, doch dan meer afgerond, kelk open, in matig diepe holte.</p>	2.	<p>groenachtig geel, aan de zonzijde met kleine bruinroode vlammen, welke als door licht graauwe dunne roest heen schemeren, om de steelholte meer graauwen roest, ook hier en daar verspreid.</p>	<p>Novemb. Maart.</p>	<p>1 T. 1 K.</p>	<p>Alle vor- men.</p>	<p>Op paradijs veredeld is deze soort reeds in October te ge- bruiken.</p>
<p>146. Wijnzure.</p>		<p>Fig. 4, in den regel iets platter, kelk half open, in eene vlakke schotelvor- mige holte.</p>	3.	<p>ligt geel, met regelmatig verdeelde bruine stippen, zonzijde ligt rood overtogen, hier en daar eenigen roest.</p>	<p>Jan. April.</p>	<p>2 T.</p>	<p>Hoogst.</p>	<p>In Januarij het best te ge- bruiken, later verliest hij allen smaak.</p>
<p>147. Zalker Roode. Zalker Aagtje.</p>		<p>Fig. 7, naar den kelk meer spits, naar den steel meer zacht afgerond, veelal scheef ge- vormd.</p>	4.	<p>oudgeel, geheel met fraai rood karmozijn overtoegen, waarin aan de zonzijde donkerder vlammetjes.</p>	<p>Decemb. Mei.</p>	<p>2 T. 1 K.</p>	<p>Hoogst.</p>	<p>Zeer vruchtbaar, wordt in de omstreken van Zalk, Overijssel, veel gevonden, van daar wel- licht de naam.</p>
<p>148. Zoete St. Jans-appel. Zoete Mooi-Meisje. Zoete St. Jacob.</p>	<p>Overmaas.</p>	<p>Fig. 7, iets lager, en naar den kelk meer afgerond.</p>	4.	<p>geel, bijna geheel bezet met bloe- dig roode streepjes en vlammen.</p>	<p>August.</p>	<p>2 K.</p>	<p>Hoogst.</p>	<p>Een der vroegste zoete zo- mer-appelen, is zeer klein.</p>
<p>149. Zoete Zomer-Aagt.</p>		<p>Fig. 8, naar den kelk meer afgerond, al- zoo minder inge- bogen.</p>	3.	<p>rooigeel, aan de zonzijde met ligt rood overtoegen.</p>	<p>August. Septemb.</p>	<p>2 K.</p>	<p>Hoogst.</p>	<p>Zeer vroeg en milddragend, jammer dat de boom zoo aan- wraak worden lijdt.</p>
<p>150. Zomer Kruidling. Vroege Kruidling. Juffers Kruidappel. St. Jacob. Vroege Tarwappel. (Westland en Overmaas).</p>	<p>Overijssel, op eenige plaat- sen.</p>	<p>Fig. 3, naar den kelk veelal met calvil- achtige ribben voorzien.</p>	3.	<p>ligt groenachtig geel, aan de zon- zijde meer hoog geel, somtijds met iets flauw rood overtoegen.</p>	<p>August. Septemb.</p>	<p>2 T.</p>	<p>Hoogst.</p>	

*Bij Vergelijking met meerdere vruchten op de Tentoonstelling is  
gebleken, dat van de Appelen :*

N<sup>o</sup>. 7. BOROVITSKY — dezelfde is met N<sup>o</sup>. 24. *Duchesse d'Oldenburg* of  
*Charlemowsky.*

de VIRGINISCHE ROSENAPFEL, H. B. fol. 229 met den *Glasappel, Sibe-*  
*rische* N<sup>o</sup>. 57.

de STOKE TULIP met *Keizer Alexander* N<sup>o</sup>. 44.

de REINETTE BOURGONDIE, met *Pariser Rambour* N<sup>o</sup>. 50.

de REINETTE SIAVEL, met *Pearmain, Engelsche winter goud* N<sup>o</sup>. 51.

Terwijl de ZOETE COURTPENDU naar de vrucht veel gelijkt naar de  
ZONZOETE N<sup>o</sup>. 98.

en de HERFST BLOEMZOETE N<sup>o</sup>. 45 nog de Synoniem draagt van *Ben-*  
*gelzoete* (Eiland Voorne.)

# PEERSOORTEN.

TWEEDE REEKS.





NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
91. Angleterre.		Fig. 5, naar den steel meer spitsrond toeloozend, ook wel een weinig ingebogen naar den steel.	4.	et groenachtig geel, aan de zonzijde met fraai donker menierrood overtoegen, zoo bedekt met licht bruinen roest, dat de grondkleur er doorschemert.	Septemb. October.	1 T.	Hoogst. Pyr.	Onder dezen naam uit de kweekrij van Simon Louis freres (gebroeders Simon Louis) te Metz ontvangen; zeer milddragend, uitmuntende vrucht.
92. Anne du Bourg.		Fig. 11, naar den kelk meer afgerond, naarden steel meestal eene flaauwe inbuiging. Veelal aan de eene zijde der vrucht voorzien van eenen streepvormig ingezonken naad.	2.	et geelachtig groen, aan de zonzijde weinig dof rood, om den kelk en steel dikken, bruin-graauwen roest, hier en daar roest over de geheele vrucht en graauwe stippen.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst.	Deze soort is uit Frankrijk veel onder den naam van Double Philippe door sommige Boskooische kwekers ontvangen.
95. Bergamotte, volltragende. Sinclair. Bergamotte fertile.	H. B. fol. 81. van Mons.	Fig. 2, meestal iets langer, naar den steel met eene flaauwe inbuiging, bij den steel ook vaak eene kleine verhooging van vleesch.	4.	et citroengeel, de zonzijde met eenig licht rood overtoegen, veel bruine met graauw omringde stippen; hier en daar ligte roest.	Septemb.	2 en 5 T.	Hoogst.	Zeer milddragend.
94. Beurré Bachelier.		Fig. 11, doorgaans breeder, ook naar den steel, welke meestal eenzijdig in de vrucht steekt.	2.	er ligt groenachtig geel, aan de zonzijde meer goudgeel, bij den kelk en steel eenige roest, fijne ligt graauwe stippen.	October. Novemb.	1 T.	Pyr.	
95. Beurré, blanke zomer-		Fig. 11, naar den steel meestal iets ingebogen.	4.	oenachtig geel, zonzijde bijna goudgeel, vol graauwe stippen, regelmatig verdeeld.	August.	5 T. 2 K.	Pyr.	Deze vrucht passeert zeer spoedig; is milddragend.
96. Beurré, Coloma. Coloma's Herbstbutterbirne. Urbaniste. Piquery. Louise d'Orléans. Louis Dupont. Urbaniste.	H. B. 445. Journ. de Lyon. Ann. 2. fol. 55. Ann. 2. fol. 59. C. L. 416.	Fig. 6, naar den kelk meer zacht afgerond, somtijds iets meer langwerpig, nog al veranderlijk.	3.	oenachtig geel, zelden rood aan de zonzijde, veel licht bruine roest over de geheele vrucht.	October.	1 T.	Hoogst. Pyr.	Deze soort moet weinig of niet gesnoeid worden, draagt ook niet vroeg; in het Handbuch is ook de Syn. Beurré-Gens aan deze soort gegeven, wat ons noz niet zeker is; ook beroept men zich aldaar op Ann. 3. fol. 69 en fol. 17, waar de Beurre Drapiez en Serrurier d'Automne beschreven en afgebeeld zouden zijn. Wij hebben deze soorten in dit of de andere deelen niet gevonden!
97. Beurré Mondelle.	Bavay.	Fig. 4, naar den steel, welke meestal schuin in de vrucht steekt, zacht spits afgerond, somtijds met eene zeer kleine inbuiging onder den steel; naar den kelk ook iets ronder.	4.	roengeel, zonzijde veelal met iets bruin rood overtoegen, over de geheele vrucht met licht bruinen roest bijna bedekt, zoolat de grondkleuren er slechts doorschemeren.	Septemb. October.	2 T.	Hoogst. Pyr.	Zou een' eersten rang kunnen innemen om hare saprijkheid en bergamotachtigen geur, indien haar vleesch niet zoo drof korrelig ware; trouwens dit heeft de Jutepeer ook en toch is ze hemind.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE
98. Beurré St. Nicolas.		Fig. 9. naar den kelk afgerond, naar den steel meer spits afgerond, somtijds eene kleine inbuiging.	3.
99. Beurré Superfin (Goubault).	Journal de Lyon.	Fig. 3. naar den steel meer spits rond toeloozend, de vrucht meestal verlengd met een vleeschuitwas; het welk zich aan den steel vasthecht.	3.
100. Broompark. Broom-Park.	C. L. 149. Journal de Lyon.	Fig. 2.	
101. Campanile. Klokkenpeer.		Bijna gevormd als een <i>groene komkommer</i> , doch in 't midden der vrucht meestal eene zachte inbuiging; kelk klein, gesloten.	
102. Cent Couronnes.		Fig. 8. naar den steel zacht spits afgerond; naar den kelk fraai rond aflopend; kleine ribben om den kelk; lange steel.	
105. Comte de Lamy. Marie Louise the Second. Beurré Curtet. Dingler. Beurré Quetelet.	C. L. 162.  Le Roy, Angers.	Fig. 2. naar den steel meer langwerpig afgerond; kelk half open, groote kelkbladen.	
104. Délices de Chaumont.	Bavay.	Fig. 14. naar den kelk iets meer afgerond. Kleine kelk, open. Kelkbl. onvolkomen.	

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
groenachtig geel, zelden iets rood, veel dunne ligt graauwe roest en stippen.	October.	1 T.	Pyr.	
oudgeel, zelden rood, bijna geheel overtoegen met ligt bruinen roest.	Septemb. October.	1 T.	Hoogst. Pyr.	Uitmuntende rijpe vrucht.
ligt groenachtig geel, bijna geheel bedekt met bruin graauwen roest en stippen.	Novemb. Decemb.	2 T. 1 T.	Hoogst. Pyr.	Zeer zeurig en vruchtbaar.
ligt geel, vol ligt bruin graauwe stippen, om den kelk een weinig roest.	Novemb. Decemb.	5 T.	Hoogst. Pyr.	Eene soort, welke in eene kweekerij alhier is gevonden, om den zeldzamen vorm en grootte waardig te kweken; verlangt om de grootte der vrucht beschutte standplaats.
ligt geel met een weinig groen, zonzijde een weinig zacht rood, veel kleine bruin graauwe stippen, om den kelk en steel een weinig roest.	October.	1 T.	Pyr.	Zeer vruchtbaar; de vruchten aan trossen bijeen.
groenachtig geel, aan de zonzijde bruinrood vlamachtig overtoegen, hier en daar weinig roest meest om den kelk.	October.	1 T.	Pyr.	
ligt geel, aan de zonzijde met ligt droevig bruinrood overtoegen, zeer dunne ligt graauwe roest hier en daar verspreid; kleine bruine stippen: bij den steel meer roest.	October. Novemb.	2 T.	Pyr.	

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Kleur.	GROOTE.	Kleur.	TIJD VAN GEbruik.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVOEM.	OPMERKINGEN.
105. de Tongres (Durondeau.	Ann. de Pom. 5, pag. 15. Journal de Lyon.	Fig. 11. naar den steel meer spits rond toeloopeud. den steel veelal eenzijdig en dan onder den steel iets ingebogen; zeer bultig over de geheele vrucht.	1.	hoog geel. zonzijde met veel bruinrood overtogen, bijna geheel bedekt met bruinen roest.	October. Novemb.	1 T. 2 T.	Pyr.	Minder op Kwee aan te bevelen, daar de vrucht dan iets wrangs heeft in den smaak.
106. Doyenné d'Alençon. Doyenné d'hiver nouveau. Doyenné d'hiver d'Alençon. Doyenné Marbré. St. Michel d'hiver.	Ann. de Pom. 8, pag. 15. Journal de Lyon. Bivort.	Fig. 5, naar den steel meestal spits afgerond. Kleine kelk. bijna zonder kelkbladen.	5 en	roevig groenachtig geel. zelden eenig rood. vele groote graauwe stippen en roest.	Jan. Mei.	1 T.	Leib. en Pyr.	Gelijkt in de vrucht zeer veel naar de Berramotte de Pente-côte. zie n°. 11; zeer vruchtbaar.
107. De Deux Soeurs (Esperen.	Ann. de Pom. 5, pag. 27. Journal de Lyon.	Fig. 12. naar den steel minder ingebogen. naar den kelk eivormig afgerond; zeer regelmatige fraaije vrucht.	2.	lad. ligt citroengeel zonder eenig rood. hier en daar groene vlekjes met fijne bruine stippen. zeer fijn bezaaid. een weinig roest om den kelk.	October. Novemb.	1 T.	Pyr. en Leib.	
108. Duchesse de Brabant.	Ann. de Pom. 2, pag. 97.	Fig. 6. meestal naar den steel ingebogen. somtijds naar den kelk zacht afgerond. Kleine kelk. in kleine holte.	2.	groenachtig geel. later meer hoog geel. weinig rood. vol graauwe stippen. om den kelk en steel veel roest.	October.	1 T.	Pyr. en Leib.	
109. Eleonie Bouvier.		Fig. 11. iets korter; naar den steel eene kleine inbuiging. naar den kelk fraai afgerond.	5 en	ligt geel. aan de zonzijde met ligt rood overtogen en iets gevlamd. veel lederkleurige roest. vooral om kelk en steel.	October.	1 T.	Pyr.	Zeer vruchtbaar.
110. Excellentissime.	C. L. 227.	Fig. 12. doch over 't geheel veel dikker. Fraaije vrucht.	2.	itroengeel. aan de zonzijde fraai bruinachtig rood. vlamachtig overtogen. in 't geel veel groene stippen. welke aan de zonzijde meer bruin voorkomen.	Septemb. October.	1 T.	Pyr.	
111. Frédéric de Württemberg (van Mons. Beurré de Montgeron. Butterbirne von Montgeron.	H. B. 421.	Fig. 6. naar den steel meestal eenzijdig ingebogen, iets meer naar den kelk afgerond. den kelk matig diep. wijd open. met groote kelkbladen.	5.	oudgeel. aan de zonzijde met veel miljoenrood overtogen en gevlamd. bruine stippen en hier en daar eenige roest. in het rood zijn de stippen bruin met geel omringd.	Septemb.	1 T. 2 T.	Pyr.	Het verschil met de Medaille d'or is uitwendig merkbaar. daar deze vrucht niet die sterke inbuiging heeft. en de kleur der vrucht veel vrolijker aanzien heeft; de steel is verdikker en staat meest recht in de vrucht. de kelk wijd open. terwijl de Medaille d'or meestal gesloten is; ook in 't gewas het onderscheid groot.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE
112. Grand-Monarch van Schiedam.		Fig. 6. naar den steel veelal aan de eene zijde eene kleine inbuiging; naar den kelk meer afgerond; kelk half open in matig diepe holte, kleine kelkbladen.	1.
113. Howell.	Amerika. Journal de Lyon.	Fig. 14, doch naar den steel iets meer afgerond, evenzeer naar den kelk wat afgerond; kelk klein, open, korte kelkbladen.	5.
114. Keizerin, groote blanke.		Fig. 14. naar den steel iets spitsvormig afgerond, naar den kelk meer zacht afgerond.	2.
115. Keizerin-Rhijnsche. Rinsche Keizerin.		Fig. 12, doch korter; naar den steel minder ingebogen, naar den kelk meer afgerond; zeer dikke en lange steel, over 't geheel dikker als Fig. 12.	5.
116. Leopold Premier.	Ann. de Pom. 6. pag. 5.	Fig. 6. naar den steel iets ingebogen, naar den kelk meer afgerond; kelk klein, half open.	4.
117. Louise bonne d'Avranches. Poire de Jersey. Bonne Louise d'Avranches. Bonne de Longueval. Louise Bonne (of Jersey). Beurré, ou Bonne Louise d'Araudore. William the Fourth.	Ann. de Pom. 6. fol. 29. Journal de Lyon. C. L. 299.	Fig. 11. iets meer afgerond naar kelk en steel; kelk in kleine holte, open, kleine kelkbladen.	2.
118. Marie Louise Duquesne. von Humboldts Butterbirne. Marie Louise. Forme de Marie Louise.	H. B. 141. Oberdieck. C. L. 507.	Fig. 12, doch korter, naar den kelk meer eivormig afgerond.	2.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL-KEER BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
roengeel, aan de zonzijde fraai bruinrood overtogen, wat naar de schaduwzijde vlamachtig voorkomt, veel kleine graauwe stippen, welke in het rood meer grijsvoorkomen.	Febr. Maart.	1 K.	Hoogst.	Is eene soort tusschen de lange en ronde gratiool; verlanzt beschutte standplaats.
ad. geel met kleine bruine stippen en roestvlekjes.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
gt groenachtig geel, zonzijde goudgeel; graauwe stippen en roestvlekken.	Septemb.	5 T. 1 K.	Pyram.	
oenachtig geel, aan de zonzijde fraai levendig rood overtogen en gevlamd, enkele stippen en roestvlekken, vooral om den kelk en den steel.	August.	2½ T.	Hoogst.	De smaak is een weinig gemuskeerd.
oenachtig geel, zonzijde bijna goudgeel, bij den steel veel roest, verder hier en daar eenige roest, en bruine stippen; heeft ook wel groene vlekjes.	Decemb. Jan.	1 T.	Pyram.	
elachtig groen, aan de zonzijde bijna geheel bruinrood overtogen, om de grijze stippen aan de zonzijde geheel bruin, aan de schaduwzijde vol stippen, ook wel een weinig roest.	Septemb. October.	1 T.	Alle vormen.	Zeer aan te bevelen om vruchtbaarheid, schoonheid en aangename smaak.
oenachtig geel, zelden iets rood, veel bruingraauwe roest, om den kelk en steel vol kleine bruin	October. Novemb.	1 T.	Alle vormen.	Als een bijzonder kenmerk voor deze soort kan dienen, dat de jonge takken veel spoorjes maken, welke naar beneden gebogen zijn, betgeen aan den boom een dwarlachtig aanzien

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Marie Chrétienne. Princesse de Parme. Braddock's Field Standard. Marie Louise (van Mons). Marie Louise, nova. Marie Louise nouvelle? Marie Louise Delcourt.	Ann. de Pom. 5. pag. 55. Papeleu. Journal de Lyon.			graauwe stippen, somtijds ook groene vlekjes.				geeft: hier te lande meer aan te bevelen als Pyr. en Leiboom.
119. Mooi-Neeltje. Belle Fille. Belle Pucelle. Schönste Sommerbirn.	Knoop Taf. 1. H. B. 585?	Fig. 2. naar den steel meer spits rond aflopend, de kelk ligt zeer vlak en is open.	4.	ondgeel, zonzijde fraai meniererood overtoegen, aan de schaduwzijde meestal roode streepjes en vlammetjes.	Julij.	5 T.	Hoogst.	
120. Nouveau Poiteau. Tombe de l'amateur. Retour de Rome.	Ann. de Pom. 4. pag. 21. Journal de Lyon.	Fig. 9. doch minder ingebogen naar den kelk en steel, is somtijds ook naar den kelk wel rond.	2.	ligt groen, iets geelachtig, op kwee aan leiboom somtijds iets ligt rood; vol graauwe groote stippen, om kelk en steel eenig roest, en hier en daar ook verspreid.	October. Novemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar.
121. Osband's Summer. Osband's Summer.	Le Roy. Angers.	Fig. 5. naar den steel zacht rond toeloozend, de kelk vlak liggend, kelk half open.	4.	ligt geel, zonzijde een weinig ligt rood gevlamd en overtoegen, zeer dunne ligt graauwe roest hier en daar verspreid.	August.	1 T.	Pyram.	Aanbevelenswaardig als zomervrucht.
122. Pius IX. Pie IX (Bivort).	Bavay. André Le Roy. Angers.	Fig. 5. naar den dikken steel weinig ingebogen, nog al spits toeloozend, de inbuiging meest eenzijdig, naar den kelk een weinig afgerond, kelk half open, in kleine holte.	4.	eer bleek geel, aan de zonzijde iets levendiger geel, vol kleine graauwe stippen, en vooral om den kelk en bij den steel eenige ligt bruine roest.	Septemb. October.	2 T. 5 T.	Pyram.	Niet aanbevelingswaardig; is nog al grof van vleesch, wel saprijk, doch daarvoor van smaak.
125. Suffolk Thorn.	C. L. 406.	Fig. 2. naar den steel meer toegespitst afgerond, kleine kelk, bijna zonder kelkbladen.	4.	ligt geel, met veel licht bruinen roest over de geheele vrucht, zonzijde iets rood, doch als met roest bedekt.	Septemb. October.	1 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar.
124. Van Mons Léon Leclerc. Van Mons de Léon Leclerc. Van Mons Butterbirne.	Ann. de Pom. 5. fol. 51. Journal de Lyon. H. B. 495.	Fig. 5. naar den kelk meer eivormig afgerond, in het midden der vrucht aan de eene zijde eene inbuiging, kleine kelk in ondiepe holte.	1.	ligt groen met veel bruin graauwen roest, in het roestige met grijze stippen.	October. Decemb.	1 T.	Pyram. Leib.	Niet raadzaam om op kwee te veredelen, tenzij voor lage kroontjes; groeit niet sterk.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTE
125. Wildemanspeer. Giesen Wildemanspeer.	In de streken van de provinc. Zuidholl. waar het riviertje de <i>Giesen</i> doorstroomt, uit het zaad gewonnen en reeds tamelijk verspreid.	Fig. 11, doch naar den steel minder ingebogen, naar den kelk fraai afgerond, rondom den kelk zeer geringe ribbetjes, kelk half open, in kleine holte.	3.
126. Zoetemanspeer. Soeteman's. Zotman's. Spuitpeertje. Roode Wangetje (vermoedelijk). Langhalsje. Wijnkroes.	Knoop Taf. 1.	Fig. 10, naar den steel zeer spits ingebogen, toeloopend, steel zeer lang, meestal kromgebogen, kelk half open, nog al vlak liggend.	4.
127. Zomer St. Lourens. Zomer Louwtje. Parmanjepeer. Roggepeer.	Betuwe. Overijssel.	Fig. 12, doch korter, naar den kelk meer breed afgerond.	4.

Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	HANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
ligt geel, aan de zonzijde veelal goudgeel, met fraaije menierroode vlammen en streepjes, veel lichtgrijze stippen om den kelk en hier en daar over de vrucht ligte kaneelkleurige roest.	Febr. Mei.	1 K.	Hoogst.	Zeer aanbevelenswaardige peer voor de keuken en den handel; draagt veel en spoelie; uitmuntend om te stoven.
oudgeel, zonzijde met menierrood vlamachtig overtogen, ook wel iets gestreept	Julij. August.	5 T.	Hoogst.	
oudgeel met groene stippen, zonzijde fraai rood gevlekt, in welk rood de stippen geel voorkomen.	August.	5 T.	Hoogst.	

Op de Tentoonstelling is bij Vergelijking der vruchten gebleken, dat:

N<sup>o</sup>. 60. LANGE GROENE PERZIKPEER, ook uit Frankrijk ons is gezonden onder den naam van *Longue Verte* (Plougastel);

» 61. RONDE PERZIKPEER, werkelijk de *Deutsche National Bergamotte* is, in Deutschland zoo beroemd;

» 62. POIRE MADAME, gelijk aan «*die Sparbirne*» is, wat ons bij de beschrijving dier Peer nog niet duidelijk was:

terwijl de BERGAMOTTE, DUBBELDE, N<sup>o</sup>. 8, ook nog de Synoniem voert van *Oranje Bergamot* (Westland en Zeeland op sommige plaatsen);

de echte ORANJE BERGAMOT of BERGAMOTTE MUSQUÉE is echter eene andere soort.

## K E R S E N.



Bij het beschrijven van kersensoorten doen zich eigenaardige moeilijkheden voor, waarmede wij bij het beschrijven van de Appel- en Peer-soorten minder te strijden hadden, als:

met den vorm, welke veel minder als bij gemelde vruchtsoorten uiteenloopt; de kleur, welke bij vele soorten zoo weinig verschilt, dat er geene termen zijn, waarmede men zich duidelijk kan maken; de tijd van rijpwording, hetgeen somtijds slechts een verschil van 2 à 6 dagen uitmaakt, enz.

Daarbij komt, dat men bij ons te lande, bijna zonder uitzondering, alleen de dubbele Meikers wil planten, waardoor het kweeken van andere voortreffelijke kersensoorten minder behoefte is, waarvan onkunde met deze soorten het gevolg zijn moet.

In den regel beschouwt men de kers bij ons slechts als eene dessertvrucht. Onze naburen, vooral de Duitschers, wenden haar ook aan voor huishoudelijk gebruik, ja drogen sommige soorten.

Wij gelooven, dat van de Kers meer nut te trekken is dan er doorgaans van genoten wordt; het is daarom dan ook, dat wij eenige soorten beschrijven, waarbij wij zoo eenvoudig mogelijk te werk gaan door tabelarisch in de 1<sup>ste</sup> kolom de Namen en Synoniemen op te geven:

» » 2<sup>de</sup> » waar wij de vrucht beschreven vinden;

» » 3<sup>de</sup> » de vorm der vrucht:

1. Platronde, b. v. de Groszer Gobet en Oranje Kers;
2. Rond, » de dubbele Meikers;
3. Hoogronde, » de Reine Hortense;
4. Hartvormig, » de Eltonkers.

(hierdoor verstaan wij Kersen, welke naar den steel het breedst zijn, en naar het stempelpuntje (het uiterste van de vrucht tegenover den steel) smaller afronden, en somtijds ook wel puntig toelopen; de steel staat bij deze soort kersen meestal ingedrukt).

5. Stomphartvormig, b. v. de Adams Crown.

(deze gelijken hoofdzakelijk aan den vorm N<sup>o</sup>. 4, doch zijn naar het stempelpuntje afgeplat, ook wel een weinig ingedrukt).





NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
1. <b>Adam's Crown.</b> Adams Herzkirsche.	C. L. 1. H. B. 5ten Band fol. 99.	N <sup>o</sup> . 5.	3.	rijgeel, met rosékleurige aderen aan de zonzijde.	1 Per.	1ste.	Hoogst. Pyram.	Zacht vleesch, milddragend, helder sap, niet gekleurd.
2. <b>Belle de Chatenay.</b> Belle de Magnifique. Belle de Sceaux. Chatenay's Schöne.	Ann. de Pom. 1. fol. 61.  H.B. 5, fol. 179.	N <sup>o</sup> . 2.	2.	eukler rood, schaduwzijde wit rosé.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	Saprijk zacht vleesch, 't sap is niet gekleurd, zeer milddragend.
5. <b>Black Eagle.</b> Schwarzer Adler.	C. L. 15. H.B. 5, fol. 471.	N <sup>o</sup> . 2.	3.	wartachtig.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, donkerkleurig sap, milddragend.
4. <b>Black Tartarian.</b> Fraser's Black Tartarian. Ronalds's Black Heart. Black Circassian. Black Russian. Schwarze Tartarische. Guigne noire de Russie. enz.	C. L. 72. Ann. de Pom. 6. fol. 59.  H. B. 5. fol. 61. Frankrijk.	N <sup>o</sup> . 5.	2.	glanzend zwart.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, donkerkleurig sap, milddragend, uitmuntende soort.
5. <b>Coë's Carnation.</b>	Amerikaan- sche soort uit Engeland inge- voerd.	N <sup>o</sup> . 2.	2.	voorschijnend glanzend licht rood.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Zachte saprijke kers, aangename smaak, 't sap is niet gekleurd, kleine steen.
6. <b>Elton.</b> Elton Kirsche. Bigarreau d'Elton.	C. L. 54. H.B. 5, fol. 105. Ann. de Pom. 6. fol. 25.	N <sup>o</sup> . 4.	1.	velachtig wit, met licht rood geaderd en gestippeld.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, 't sap niet gekleurd, een der beste en schoonste kersen, zeer milddragend.
7. <b>Glaskers, dubbelde.</b> Oranje Kers. Doppelte Glaskirsche. Grosze Amarelle. Polnische Kirsche. Roi de Prusse.	H.B. 5. fol. 165.	N <sup>o</sup> . 1.	3.	ligt doorschijnend rood, schaduwzijde bleek rood.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	't Vleesch is zacht, saprijk, 't sap is ongekleurd, en rinsch van smaak, een zeer merkbaar kenteeken is, dat bij het gebruik de steel aan den steen vastgehecht blijft.
8. <b>Groszer Gobet.</b> Kurzstielige Amarelle. Flemish. De Kent. Montmorency à Courte Queue. A Courte Queue de Provence. English Weichsel. Kaiser Amarelle. Haneballekes.	H.B. 5. fol. 545. C. L. 56.	N <sup>o</sup> . 1.	5.	voorschijnend glanzend rood.	2 Per.	1ste.	Hoogst. Pyram.	Zacht saprijk rinsch vleesch, 't sap iets kleurig, traanen mild dragend.
	Gend, Belgie.							

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
9. Hofwijcker, zachte bonte.		N <sup>o</sup> . 4. Doch niet gepunt, steel matig lang.	2.	lichtachtig geel, aan de zonzijde rood overtoegen.	1 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, sap zonder kleur, vruchtbaar, en aangenaam van smaak.
10. Knight's Early Black.	C. L. 39.	N <sup>o</sup> . 5. Matig lange steel.	2.	wartachtig glanzend.	1 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, donkerkleurig sap, zeer vroeg en milddragend.
11. Lauermann. Bigarreau Napoleon. Grosze Prinzessin. Wellington. (Meerdere synoniemen aan te geven; komt ons voor alsnog gevaarlijk te zijn).	C. L. 12. H.B. 5, fol. 125. Ann. de Pom. 1, fol. 25.	N <sup>o</sup> . 4. Niet zeer puntig, matig lange steel.	1.	glanzend bleek geel, aan de zonzijde levendig rood overtoegen, gestreept en gemarmerd.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Vast vleesch, doch niet hard, 't sap niet gekleurd, eene der beste kersen, zeer vruchtbaar.
12. Louis Philippe.	Chiswick.	N <sup>o</sup> . 2. Matige steel.	2.	eer donker, bijna zwart bruin.	5 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht vleesch, gelijk aan de dubb. zure Morel, donker gekleurd sap; wordt ook als Synoniem van de kers Reine Hortense in 't Handb. 3, fol. 67 aangegeven, dit is evenwel eene geheel andere soort; uitmuntende kers.
13. Meikers, dubbelde. Rothe Maikirsche. May Duke. Early Duke. Large May Duke. De Hollande. Royale Hative, enz.	H. B. 5, 151. C. L. 61. Ann. de Pom. 1, fol. 81.	N <sup>o</sup> . 2. Matige steel.	2.	donker bruinrood, glanzend.	1 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht vleesch, 't sap iets gekleurd; deze oude beroemde kers is hier te lande wel zoo bekend, dat ze geene aanbeveling behoeft.
14. Mezel, Bigarreau Monstrueux de Mezel.	Ann. de Pom. 6, fol. 55.	N <sup>o</sup> . 5. Aan den stempelpunt iets ingedrukt, matige steel.	1.	glanzend zwartachtig bruin, hier en daar eenig karmozijn rood.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Vast vleesch, doch niet hard, dus niet knappersachtig, 't sap is gekleurd, uitmuntende kers.
15. Merveille d'Automne. Belle Agathe de Novembre Thiéry.	Papeleu. Ann. de Pom. 5, fol. 9.	N <sup>o</sup> . 5. Bijna rond; de steel is nog al lang.	5.	bruinrood, als met geel gaderd, glanzend.	Septemb. October.	2de.	Hoogst en Leib.	Hard vleesch, knappersachtig, het sap is niet gekleurd, als eene late kers nog al aan te bevelen.
16. Montmorency de Bretonneau.	Bavay.	N <sup>o</sup> . 4. Doch minder ingedrukt, naar de stempelpunt iets smaller toeloozend; matig lange steel.	2.	donker helder rood, schaduwzijde iets ligter rood.	2 Per.	2de.	Hoogst.	Zacht sappig vleesch, iets ruw, doch aangenaam, de steen is groot, daarom slecht's 2 <sup>de</sup> rang, het sap is niet gekleurd.
17. Morellen, dubbelde zure. Morello. Black Morello. Milan, etc. Grosze lauge Lothkirsche. Doppelte Schattenmorelle.	C. L. 62.    H.B. 5, fol. 525. Hannover.	N <sup>o</sup> . 5. Iets ronder dan Reine Hortense, lange steel.	1.	zwart bruin glanzend.	5 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht sappig vleesch, zuurachtig, aangenaam, 't sap is gekleurd, overbekende kers, welke aan de Noordzijde wordt geplant, en zich dan laat bewaren tot het begin der maand October.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROORTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Griotte du Nord. Pfund Kirsche.	Frankrijk. Scandinavie.							
18. Morellen, zoete. Brusselsche Bruine.	Knoop. 2de afd. fol. 15.	N <sup>o</sup> . 5. Als kers N <sup>o</sup> . 17; lange steel.	2.	hart bruin, iets ligter dan kers N <sup>o</sup> . 17.	5 Per.	1 à 2.	Alle vormen.	Zacht saprijk vleesch, zoetachtig rinsch, aangenaam. 't sap is gekleurd; de kers onder den naam "Brüsseler Braune" H. B. 3 fol. 329, en C. L. N <sup>o</sup> . 66, onder den naam "Ratafia" beschreven, is, naar de beschrijving teoordeelen, niet dezelfde.
19. Ohio Beauty. Amerikaansche soort.	Uit Engeland ingevoert.	N <sup>o</sup> . 2. Naar de stempel- punt iets toeloopend platgedrukt; matige steel.	2.	gt rood, zonzijde bruinrood.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Vast vleesch, zonder hard te zijn, zoet sap, iets gekleurd; fraaie kers.
20. Ostheimer Weichsel. Ostheim. Zwerg Weichsel. Fränkische Wucherkirsche.	H.B. 5, fol. 187. C. L. 64.  Hanuover.	N <sup>o</sup> . 2. Een weinig plat- gedrukt; matige steel.	2.	anzend donker bruin rood, bijna zwart; in den naad iets ligter.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht vleesch, volsappig, aangenaam, rinsch, met iets zoetachtig getemperd, 't sap gekleurd, zeer milddragend; voor den dwerg- en pyramiden- vorm zeer aan te bevelen; uit- muntende kers.
21. Ridderoordtsche. Late Kers van Ridderoordt. Bigarreau Tardive.	Ridderoordt bij Rhede. Gelderland.	N <sup>o</sup> . 5. Iets platgedrukt; matige steel.	2.	itgeel, met roodbruin aan de zonzijde.	5 Per.	1ste.	Hoogst.	Vast vleesch, zonder hard te zijn, sap niet gekleurd; voor eene late kers eene der aanbevelingswaardigste.
22. Reine Hortense. Königin Hortensia. Belle Hortense. Monstrueuse de Bavay. Hybride de Laeken. Louis XVIII. Reine de Cerises. Belle de Jodoigne. Belle de Laeken. Morestin. Rouvroy, enz.	Ann de Pom. 1. 25. H.B. 5, fol. 167.	N <sup>o</sup> . 5. Meestal zeer lange steel.	1.	anzend doorschijnend ligt rood, bijna geheel met levendig donker rood geaderd, gemarmerd en overtoegen.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht saprijk vleesch, zoetachtig met blaauw rinsch getemperd; sap ongekleurd, eene der grootste en schoonste kersen, doch niet milddragend, waarin de grootte der vrucht evenwel te gemoet komt; de Syn. Louis Philippe hoort niet bij deze soort.
25. Rouaansche.		N <sup>o</sup> . 5. Iets afgerond; ma- tige steel.	2.	itgeel, aan de zonzijde rozerood overtoegen en gemarmerd.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Zacht vleesch, sap zoet, ongekleurd; deze soort is zeer kennelijk aan hare afwijkende, bijna hangende takken.
24. Spaansche, gele. Lady Southampton's Yellow? Spanish Yellow.	C. L. fol. 60.	N <sup>o</sup> . 5. Nog al langwerpig, niet gepunt, matige steel.	5.	oggeel, zelden een weinig geel- rood aan de zonzijde.	2 Per.	2de.	Hoogst.	Vleesch zacht, niet zeer sap- rijk, sap ongekleurd, groeit snel.
25. Spaansche, roode.		N <sup>o</sup> . 5. Naar de stempel- punt iets smaller, zonder puntig te zijn, de steel merkbaar langer dan van de Zwarte Spaansche.	2 of 5.	hartachtig, in den naad violet- kleurig rood, 't welk aan de schaduwzijde door het zwartachtige heen schemert.	2 Per.	2de.	Hoogst.	Vleesch zacht, matig rijk aan sap, 't welk gekleurd is.

NAMEN en SYNONIEMEN.	gemaakt in :	Vorm.	GROOTTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
26. Spaansche, vroege witte.		N <sup>o</sup> . 5. In den regel naar de stempelpunt iets smaller. veelal iets ingedrukt, matige steel.	2.	lichtig geel, iets rosé; aan de zonzijde met iets ligt rosé gaderd en overtogen.	2 Per.	1ste. 2de.	Hoogst.	Vleesch zacht, nog al saprijk. 't sap ongekleurd; matig vruchtbaar, onderscheidt zich van alle andere soorten door hare vroegtijdige ontwikkeling, vooral merkbaar in de bladknoppen.
27. Spaansche, zwarte.		N <sup>o</sup> . 3. Nadert zeer den vorm N <sup>o</sup> . 2. Matige steel.	2.	lichtig glanzend, violet doorschemerend.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Vleesch een weinig vast, doch volstrekt niet knapachtig, bijna zacht te noemen; sap donker gekleurd. Bij het beschrijven der "Spaansche" kerssoorten hebben wij zooveel afwijkingen in 't H. B. en de C. L. gevonden, dat wij zonder nader onderzoek op deze werken ons niet kunnen beroepen.
28. Van der Nat. Kirsche van der Natte. Bentenburger Natte. Doppelte Natte.	Knoop 2. fol. 14. H. B. 5. 509.	N <sup>o</sup> . 2. Meer platgedrukt naar de stempelpunt.	5.	art bruin, tamelijk glanzend.	2 Per.	2de.	Hoogst.	't vleesch is zacht, saprijk, zuurachtig; 't sap bijna zonder kleur.

# PRUIMEN.

Wij hebben bij de beschrijving van eenige soorten van pruimen dezelfde orde gevolgd als bij de Appel-, Peer- en Kerssoorten. Eenige noodige ophelderingen volgen hieronder:

Kolom 5, de vorm:

- 1) Platronde, dat is: meer breed of dik, dan hoog,  
b. v. de Heeren Pruim. Prune Monsieur.
- 2) Rond, b. v. de Kirkes, en de bekende dubb. Boere Witte pruim
- 3) Ovaal, dat is: meer hoog dan breed of dik, en daarbij aan beide zijden naar den steel en naar het stempelpuntje regelmatig stomp afgerond,  
b. v. Bleeker's Scarlet.
- 4) Eivorm, b. v. Witte Eijerpruim;  
men denke hierbij liefst aan het Ei van Eenden.
- 5) Omgekeerde Eivorm, d. i. naar den steel meer toeloopeud, naar het stempelpuntje breder afgerond,  
b. v. de Roode Eijerpruim.
- 6) Kwetsenvorm, d. i. langwerpige en spits naar den steel of naar het stempelpuntje of naar beide toeloopeud, niet zelden aan eene zijde ingebogen,  
b. v. Hongaarsche *kwetsen*.

Kolom 4, de grootte:

Normaal der langwerpige Pruimen.

- |                  |         |                     |
|------------------|---------|---------------------|
| 1 <sup>ste</sup> | grootte | de witte Eijer.     |
| 2 <sup>de</sup>  | "       | blauwe Eijer.       |
| 3 <sup>de</sup>  | "       | Italiaansche kwets. |
| 4 <sup>de</sup>  | "       | Leipziger kwets.    |

Normaal der ronde Pruimen.

- |      |                  |         |                          |
|------|------------------|---------|--------------------------|
| 1 A. | 1 <sup>ste</sup> | grootte | Washington.              |
| 2 A. | 2 <sup>de</sup>  | "       | Boere witte.             |
| 3 A. | 3 <sup>de</sup>  | "       | Reine Claude.            |
| 4 A. | 4 <sup>de</sup>  | "       | dubb. Groene Mirabellen. |

Wij meenden de grootte tweeledig te moeten geven, omdat in den regel eene lange vrucht grooter schijnt te zijn dan de ronde, hoewel de ronde welligt de grootste quantiteit vleesch bezit.

Kolom 9, Aanmerkingen.

Hierbij dient nog ter opheldering:

dat wij ter beoordeeling eener Pruim, of ze in rang tot de 1<sup>ste</sup> of 2<sup>de</sup> kwaliteit behoort, ons doorgaans daarnaar geregeld hebben of de steen los in het vleesch ligt, of meer vast aan hetzelfde zit. De Pruimen, waarbij de steen los is, zijn doorgaans de beste en het aangenaamst van smaak; waar de steen aan het vleesch zit, behoudt ze, vooral nabij de steen, altijd eenig zuur.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR AELKEN BOOMVOORM.	OPMERKINGEN.
1. <b>Abrikoze-Pruim, bonte.</b>	Knoop 2. fol. 19.	N <sup>o</sup> . 5.	5.	Menachtig geel met bruinrood overtoegen, met purperroode vlekken als gemarmerd.	half Septemb.	1ste à 2de.	Hoogst.	Vleeschachtig, steen los in de vrucht. 1 Eenjarige hout is zeer wolachtig.
2. <b>Abrikoze-Pruim, roode.</b> Rothe Apricosen Pflaume. Abricotée Rouge.	H. B. 5, fol. 425. C. L. 2.	N <sup>o</sup> . 5. Iets ronder, naar de stempelpunt meer ingedrukt.	2.	Vlek geel met licht rood overtoegen, op zynzijde meer donkerrood.	half Septemb.	1ste.	Hoogst.	Vleesch geelachtig, matig vast, steen los. Zeer aangenaam.
3. <b>Apricosenartige Pflaume.</b> Abricotée de Tours. Abricotée.	H. B. 5, fol. 525.	N <sup>o</sup> . 2.	5.	Menachtig geel, somtijds roode puntjes en vlekjes en groene aderen.	half Septemb.	1ste.	Hoogst.	Vleesch geel, matig vast, saprijk, steen los. Zeer aan te bevelen.
4. <b>Anne Lawson.</b> Anna Lawson.	Dauvesse. Orleans.	N <sup>o</sup> . 5. Iets ronder.	2.	Janje, met veel purperrood aan de zynzijde overtoegen, waarin veel bruine stippen.	half August.	2de.	Hoogst.	Vleesch geel, zacht, geurig, steen niet volkomen los, zou anders tot den 1 <sup>sten</sup> rang gerekend kunnen worden.
5. <b>Azuré Hâtive.</b> Blaauwe Wijnpruim. Blue Gage. Black Perdrigon. Violet.	C. L. fol. 161.	N <sup>o</sup> . 2. Soms tijds wat eenzijdig rond.	2.	Akerblauw purper, met wasem overtoegen.	Julij. August.	2de.	Hoogst.	Vleesch groenachtig geel, zacht, matig saprijk, steen los, groeit goed. Zeer vruchtbaar.
6. <b>Bleeker's Scarlet.</b> Bleekers rothe Pflaume. Die Lombard.	H. B. 5, 419.	N <sup>o</sup> . 5.	5.	Linrood, waardoor hier en daar groenachtig geel zichtbaar is; goudachtig groene stippen.	August. Septemb.	2de.	Hoogst.	Zacht geel vleesch, steen half los. Zeer vruchtbaar.
7. <b>Boere Witte, dubbelde.</b> Weisse Jungfern Pflaume. Virginale à fruit blanc. Altesse blanche.	Knoop 2. fol. 19. H. B. 5, 519. Frankrijk.	N <sup>o</sup> . 2.	2.	Geel, wasachtig, met zeer licht groene aderen, dunne huid, met wa-em bedekt.	half August.	1ste.	Alle vormen.	Zacht geel vleesch, zeer saprijk, aangenaam, steen los, een der beste Pruimen voor het Nederl. klimaat, door sommige kweekers te Boskoop ook wel als Witte Abrikoze Pruim verspreid.
8. <b>Caledonian.</b> Nectarine. Howell's Large. Peach. Jenkins Imperial. Rothe Nectarine.	C. L. 82. H. B. 5, 295.	N <sup>o</sup> . 2. Soms tijds wat eenzijdig rond.	1.	Menachtig bruin, witgele stippen, wasem dun, witblauw.	half August.	1ste.	Hoogst. Leib.	Groenachtig geel, matig vast vleesch, steen half los. Verlangt eene warme standplaats; moet niet met de Goliath C. L. 56 worden verward, welke ook de Synoniem draagt van Caledonian.
9. <b>Coë's Golden Drop.</b> Coë's. Coë's Imperial. Goldendrop. New Goldendrop. Bury Seedling. Fair's Goldendrop. Golden Gage. Coë's rothgeflechte Pflaume.	C. L. 21. Ann. de Pom. 5, fol. 45. H. B. 5, 265.	N <sup>o</sup> . 5. Naar den stempel meer lang eivormig.	2.	Geel, aan de zynzijde roodbruine stippen en figuren, zeer dunne wasem.	Septemb.	1ste.	Alle vormen.	Goudgeel, zacht vleesch, matig saprijk, steen los. Verlangt hier te lande warme standplaats, en is dan uitmuntend.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOT.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
10. Damas d'Espagne.	Simon Louis frères te Metz.	N <sup>o</sup> . 5. Naar den steel evenwel zeer regelmatig afgerond, fraaije regelmatige vorm.	1.	Arperrood, aan de zonzijde meer blaauw, met wasem bedekt.	half August.	2de.	Hoogst. Leib.	Groenachtig geel, saprijk vleesch, steen niet volkomen los, zeer fraaije vrucht; verlangt eene warme standplaats.
11. Damas de Mougeron. Ronde Damasc. Pruum. Damas Violet.	Knoop 2. fol. 17.	N <sup>o</sup> . 2. Iets hooger rond.	2.	Arperblaauw, met wasem bedekt.	half August.	1ste.	Hoogst. Leib.	Groenachtig geel, saprijk vleesch, steen los; niet zoo goed als de kirkes, evenwel aanbevelenswaard. H. B. 3, fol. 301. Is niet dezelfde.
12. Doyenné. Dojene. Donjumer.	Knoop 2. fol. 20.	N <sup>o</sup> . 2.	2.	Mitgeel, bleek groene aderen, met wasem bedekt.	half August.	1ste.	Hoogst.	Zacht geel vleesch, saprijk, gelijk naar de Boere Witte pruim, doch is in den regel niet zoo goed, iets grooter, de steen niet volkomen los.
15. Drap d'Or d'Esperen. Esperens' Gold-Pflaume.	Flore de Serres 4. 596, 597. H.B. 5. fol. 529.	N <sup>o</sup> . 2. Meer hoog rond, ook wel wat scheef gevormd.	1. 2.	Mitgeel, met groenachtig gele vlekjes en aderen, zonzijde zelden roodbruine vlekjes.	August. Septemb.	1ste.	Hoogst. Leib.	Vleesch matig vast, goudgeel, zeer saprijk, steen los. Schoone pruim, groeit sterk; verlangt eene warme standplaats.
14. Eijerpruum, blaauwe. Violette Jerusalem-pflaum. Blaue Eierpflaume. Wahre Blaue Eierpflaume. Imperiale Violette.	H.B. 5. fol. 251. Ann. de Pom. 1. 99.	N <sup>o</sup> . 6. In den regel meer eivormig afgerond.	2.	Violetblaauw, schaduwzijde meer violetrood.	begin Septemb.	2de.	Hoogst.	Vleesch geelachtig groen, matig vast, middelbaar saprijk, steen niet volkomen los. Wordt in Duitschland zeer geroemd; in ons klimaat is zij minder goed.
15. Eijerpruum, roode. Rothe Eierpflaume. Prûne de Chypre. Magnum Bonum, Red. Imperiale. Imperiale Red. Dame Aubert Violette. Florence. Rothe Marunke. Imperatrice. Diadème. Catalonie. Fluweelpruum.	Knoop 2. fol. 20. H. B. 5. 253. G. L. 77.  Ann. de Pom. 1. 75. Westland.	N <sup>o</sup> . 5.	1.	Strood, zonzijde meer licht violetrood, somtijds marmierachtig gevekt; de geheele vrucht met witachtigen wasem bedekt.	begin Septemb.	1ste.	Alle vormen.	Vleesch geel, matig vast, saprijk, de steen los. Voor ons klimaat eene der meest aanbevelenswaardige pruimen.
16. Eijerpruum, witte. Magnum Bonum, White. Yellow Magnum Bonum. Dame Aubert. Dame Aubert Blanche. Dame Aubert Jaune. Grosse Luisante. Imperiale Blanche. Egg Plum. Wentworth.	Knoop 2. fol. 20. C. L. 78.	N <sup>o</sup> . 4.	1.	Mitgeel, aan de schaduwzijde licht groenachtig geel, zelden eenige roode stippen en vlekjes.	half Septemb. begin October.	2de.	Leib.	Vleesch geel, matig vast, niet zeer saprijk, steen vast. Voor ons klimaat slechts als lei-boom op eene goede warme standplaats aan te bevelen.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in :	Vorm.	GROOT	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOONVORM.	OPMERKINGEN.
White Holland. White Mogul. Gelbe Eierpflaume Weisse Kaiserpflaume. Gelbe Marunke. Prune d'Oeuf blanche.	H. B. 5, 595.							
17. Emperor of Japan.	Is eene Oostersche Pruim. zonder naam ingevoerd, en door ons onder dezen naam gekweekt.	N <sup>o</sup> . 4. Doch in den regel meer afgerond.	1.	ranjeachtig geel met rosé gemengd; de zonzijde gaat van 't karmozijn tot ligt violetkleurig over; geheel met wasem bedekt.	begin August.	1ste.	Leib.	't Vleesch is ligt geel, zacht, matig saprijk, steen bijna los. Prachtige vrucht. Om baren teederen groet en ligt kwetsbare huid als leshoom alleen aan te bevelen.
18. Heeren Pruim. Prune Monsieur. Herrn Pflaume. Brignole Violette.	H.B. 5, 429. C. L. 87.	N <sup>o</sup> . 1.	5 A	roper, zonzijde zwartblauw, sterk met wasem overtogen.	laatst August.	2de.	Hoogst.	't Vleesch is groenachtig geel, zacht, weekachtig, steen los. Zeer milddragend; in ons klimaat niet aan te bevelen.
19. Jefferson. Die Jefferson.	C. L. 68. H. B. 5, 551. Ann. de Pom. 5, 59.	N <sup>o</sup> . 5. Doch naar den steel doorgaans iets afnemend.	2	rooggeel, aan de zonzijde bruinrood, overtogen met vele bruine vlekjes en stippen.	half Septemb.	1ste. 2de.	Alle vormen.	't Vleesch hoog geel, zacht, saprijk, steen niet volkomen los. Wordt in Engeland zeer genoemd.
20. Kirkes-Pruim. Kirke's. Kirke's Pflaume. Kirke's Plum.	C. L. 72. H.B. 5, fol. 295. Ann. de Pom. 2, fol. 103.	N <sup>o</sup> . 2.	1 A	donker violetblauw, zonzijde met eenige bruine netachtige figuren; als of het roest is, voorzien.	laatst August. begin Septemb.	1ste.	Alle vormen.	't Vleesch is geel, met eenig groen vermengd, matig vast, saprijk, steen los, matig vruchtbaar. Van de blaauw gekleurde pruimen is deze eene aanbevelingswaardigste.
21. Kwets. Frankforter. Frankforter Pfirsichen Zwetsche		N <sup>o</sup> . 5. Naar den steel meer eivormig.	5 a	donker purperblauw, met veel wasem overtogen.	August. begin Septemb.	2de. 5de.	Hoogst.	't Vleesch groenachtig geel, om den steen bloedig rood, niet vast, bij volle rijpheid is de steen los; draagt zeer mild; misschien goed om te koutijen.
22. Kwets. Hongaarsche. Draai Kwets. Violette Dattelzwetsche. Ungarische Zwetsche. Prune datte. Prune datte Violette. Back Pflaumen.	Knoop 2, fol. 21. H.B. 5, fol. 257. Hannover.	N <sup>o</sup> . 6.	5 a	violetblauw, met veel rood purper, geheel met wasem overdekt.	half Septemb.	2de T. en 1ste K.	Hoogst.	't Vleesch is groenachtig geel, vast, steen los. Voor de tafel minder goed; om te koutijen, enz. zeer aan te bevelen. Kan ook zeer goed dienen om te drogen.
25. Kwets, Italiaansche. Italiänische Zwetsche. Fellenberger Zwetsche. Schweizer Zwetsche. Quetsche d'Italie. Dubbelde Bakpruim.	H.B. 5, fol. 241. Ann. de Pom. 5—17. C. L. 100.	N <sup>o</sup> . 6. Minder spits.	5.	violetblauw, zonzijde donkerder, dikke blaauwe wasem over de geheele vrucht.	half Septemb.	2 T. 1 K.	Hoogst.	't Vleesch is groenachtig geel, vast, steen los. Groeit veel sterker dan de bovenstaande kwets en is zeer vruchtbaar; tot hetzelfde einde aan te wend.
24. Kwets. Leipziger.	Knoop 2, 21.	N <sup>o</sup> . 6.	4.	donker violetblauw, somtijds met	laatst van Septemb.	1 K.	Hoogst.	Groenachtig geel vleesch, vast, steen half los. Groeit



NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTTE.	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Die Hauszwetsche. Gemeine Zwetsche. Quetsche. Early Russian. Enkele Bakpruim.	H. B. 5. 243. C. L. 98.	Minder spits en nog al veranderlijk.		roestige vlekken, geheel met wasem bedekt.				sterk; zeer vruchtbaar. Onze Duitsche naburen trekken aanzienlijke voordeelen van de kwtisen als handelsvruchten, en zij worden aldaar tot verschillende einden aangewend.
25. <b>Mirabelle, dubbele groene.</b>	Westland, niet de Knoopsche soort: zie Knoop 2. fol. 20.	N <sup>o</sup> . 1.	4 A	ligt geelachtig groen met iets donkerder groen als geaderd, met witten wasem overdekt, somtijds kleine bruine stippen aan de zonzijde.	begin August.	2de.	Hoogst.	Vleesch geel, matig vast, steen los, zeer milddragend. De soort onder den naam dubb. groene Mirabel, bij Knoop beschreven, is veel slechter.
26. <b>Mirabelle, enkele groene.</b> Malloot. Meloot. Grüne Mirabelle.	Knoop 2. fol. 20. H. B. 5, fol. 457.	N <sup>o</sup> . 4.	zeer klein.	geelachtig groen, somtijds grasgroen, met wasem overdekt.	begin August.	3de.	Hoogst.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, tamelijk saprijk, zeer milddragend. Goed om te confijten; steen los.
27. <b>Mirabelle, gele, kleine.</b> Gelbe Mirabelle. Mirabelle. Mirabelle Petite. Mirabelle Jaune.	H. B. 5, fol. 575. C. L. 79.	N <sup>o</sup> . 5. iets korter, somtijds bijna rond.	zeer klein.	bijna goudgeel, aan de zonzijde met roode stipjes en vlekjes, dunne wasem.	half August.	2de.	Pyram. Leib.	Vleesch geel, matig vast, tamelijk saprijk, steen los, draagt mild. Wordt in Duitschland veel gedroogd; groeit zeer gematigd, waarom ze als dwergboom het meest aanbeveling verdient.
28. <b>Pond's Seedling.</b> Ponds Sämling. Ponds Pourple.	C. L. 95. Ann. de Pom. 5. fol. 9. H. B. 5, fol. 585.	N <sup>o</sup> . 5. iets langwerpiger.	1.	purperrood, met eenig violet vermengd, dikke blaauwachtige wasem.	half Septemb.	2de.	Hoogst.	Vleesch geel, zacht, matig saprijk, steen vast. Is zeer milddragend; voor de keuken meest aan te bevelen.
29. <b>Reine Blanche.</b> Weisse Königin.	Ann. de Pom. 7. 95. H. B. 5, fol. 455.	N <sup>o</sup> . 2. Zeer weinig platgedrukt.	5 A.	witachtig geel met eenig licht groen gemengd, zonzijde met roodachtige stipjes.	half August.	1ste.	Pyram. Leib.	Vleesch geelachtig groen, zacht, saprijk, steen los.
30. <b>Reine Claude.</b> Reine Claude Dorée. Green Gage. Abricot Vert. Verte Bonne. Dauphine. Dames Vert. euz. Grosse Reine Claude. Reine Claude Verte-tiquetées. Trompe Valet. Trompe Garçon. Gute Grüne.	Knoop 2. fol. 21. Ann. de Pom. 6. 99. C. L. 57. H. B. 5, 545.	N <sup>o</sup> . 1. Niet zoo sterk gedrukt.	5 A.	geelachtig groen, aan de zonzijde groenachtig geel, met vele bruine stippen en vlekjes; dunne blaauwe wasem.	begin Septemb. ook wel half Septemb.	1ste.	Alle vormen.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, saprijk, steen los; overbekend als de beste der pruimen.
31. <b>Reine Claude Bayav.</b> Reine Claude Monstrueuse. Bayav's Reine Claude.	C. L. Supp. 105. H. B. 5, 545.	N <sup>o</sup> . 1. Doorgaans merklijk hooger.	2 A. 5 A.	geelachtig groen, aan de zonzijde een weinig geler, en ook wel met bruine stippen en vlekjes; dunne blaauwe wasem.	laatst. Septemb.	1ste. 2de.	Alle vormen.	Vleesch is groenachtig, matig vast, saprijk, steen los, minder goed dan de gewone Reine Claude, zeer milddragend. Op eene goede warme standplaats echter eerste rang.

NAMEN en SYNONIEMEN.	genaamd in:	Vorm.	GROOTTE	Kleur.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
52. Reine Claude Imperiale.		N <sup>o</sup> . 1. Niet zoo sterk gedrukt.	5 A.	groenachtig geel met veel rosé en ook wel rood vermengd, zonzijde hooggeel met groen vermengd, ook met bruine stippen en vlekjes; dunne wasem.	laatst August. begin Septemb.	1ste.	Alle vormen.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, saprijk, steen los. Zeer aan te bevelen. Onderscheidt zich van de gewone Reine Claude door haar rosé en rood, welk door het groene gemengd is.
53. Reine Victoria. Queen Victoria. Victoria, Denyer's.	Ann. de Pom. 4. fol. 45. C. L. 122.	N <sup>o</sup> . 5. Iets eivorig.	1 A. 2 A.	schoon rood purperachtig, waardoor eenig geel schemert; witte wasem.	laatst August. begin Septemb.	1ste.	Pyram. Leib.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, saprijk, zeer geurig. Wordt ten onrechte verward met Sharp's Emperor; steen los. Zeer milddragend.
54. Sharp's Emperor. Imperiale de Sharp.	C. L. 117. Ann. de Pom. 7. fol. 65.	N <sup>o</sup> . 5. Iets langer dan Reine Victoria.	1 A.	purperrood, met eenig bruin geel gemengd, ook een weinig blaauw; purper; met veel wasem.	begin Septemb.	1ste. 2de.	Hoogst en Leib.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, saprijk. Niet zo goed als Reine Victoria. Steen niet altijd los. Zeer milddragend.
55. Washington. New Washington. Franklin. Bolmar. Bolmar's Washington. Washington Jaune. Philippe 1 <sup>re</sup> . Jackson. Die Washington.	C. L. 125. Ann. de Pom. 4. 25. H.B. 5, fol. 577.	N <sup>o</sup> . 2. Iets, doch weinig hooger.	1 A.	geelachtig, zonzijde geel en rosé gemengd; dunne witte wasem.	laatst August. begin Septemb.	1ste.	Alle vormen.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, zeer saprijk, steen los. Groeit sterk; milddragend; beschutte standplaats.
56. Witte Damascene. Grosse Weisse Damascene.	Oberdieck. Aul. fol. 455.	N <sup>o</sup> . 4. Meer afgerond.	1.	Ligt geelachtig groen; witte wasem.	half August.	5de.	Hoogst.	Vleesch groenachtig geel, matig vast, nog al saprijk, steen vast. Voor de huishouding alleen geschikt; dient in Duitschland vooral als marktvrucht.
57. Witte Roggepruim.		N <sup>o</sup> . 2. Iets scheef gevormd.	4 A. iets grooter.	Bleek geel met bruine vlekjes en stippen; dunne wasem.	einde Julij	2de.	Hoogst.	Vleesch geelachtig zacht, saprijk, steen los. Vroeg rijp en zeer milddragend.

*Lijst van eenige vruchtsoorten door de Vereeniging aanbevolen ter beplanting van boomgaarden.*

N. B. Men heeft hierbij vooral het oog op zulke vruchtsoorten, welke voor den handel of op de markt reeds lang als *voortreffelijk* gekend zijn, of werkelijk *verbeteringen* mogen genoemd worden; er is ook in den regel gelet op *spoedig dragende* en *vruchtbare* soorten.

Wij volgen de Nummers van de beschrijvende vruchtenlijst 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> Reeks.

**APPELEN.**

- N<sup>o</sup>. 1. Astrachaner, Roode.
- » 8. Bellefleur, Brabantsche.
- » 24. Charlemowski.
- » 28. Codlin Spring Grove.
- » 29. Courtpendu.
- » 35. Domeniska.
- » 54. Ermgaarde, Zoete.
- » 57. Glasappel, Siberische.
- » 59. Gravensteiner.
- » 45. Herfst bloem zoete.
- » 49. Paradijs dubbelde zure.
- » 50. Pariser Rambour.
- » 51. Pearmain, Engelsche Winter goud.
- » 67. Prinzapfel.
- » 68. Princesse Noble.
- » 72. Reinette Bretagne.
- » 75. » d'Or.
- » 79. » Monstruense (Gulden).
- » 82. » Praagsche.
- » 88. » Zoete Graauwe.
- » 91. Schijveling, Vlaamsche.
- » 97. Winter bloemzoete, Doetsburgsche.
- » 99. Zoete Veen.
- » 105. Bellefleur, late zoete.
- » 131. Reinette Baumanns.
- » 140. » Landsberger.

**PEREN.**

- N<sup>o</sup>. 8. Bergamotte, dubbele.
- » 9. » herfst.
- » 16. Beurré Capiaumont.
- » 18. » d'Amanlis.
- » 24. » Diel.
- » 54. Bon-Cretien Williams.
- » 46. Duchesse d'Angoulême.
- » 47. Forellen peer.
- » 48. Jalousie de Fontenay.
- » 49. Juttepeer.
- » 55. Mouille bouche d'Été.
- » 56. Napoléon.
- » 61. Perzikpeer, ronde.
- » 77. Vijgepeer.
- » 80. Dirkjespeer.
- » 82. Foppenpeer.
- » 84. Gratiolle, ronde.
- » 83. Kamper Venus.
- » 86. Louwtjes.
- » 90. Witte Cousin.
- » 125. Wildemans peer, Giesen. (Giesen Wildemans peer).

*Aanbevelenswaardige vruchtsoorten voor de Tafel of het Dessert. Als Pyramiden en Leiboomen te planten.*

Deze soorten kunnen ook als lage kroontjes gekweekt worden voor de *kulturen van vruchtboomen in Potten*, wat vooral in Engeland en op sommige plaatsen in Frankrijk, België en Duitschland in den tegenwoordigen tijd veel opgang maakt.

In den regel kunnen voor de kweeking van lage kroontjes (met enkele uitzonderingen) alle vruchtsoorten aangewend worden, welke in onze «Beschrijving» bij de Appelen en Peren voor *alle* vormen (dus ook voor Pyramiden en Leiboomen), bij Kersen en Pruimen, hoofdzakelijk voor den Pyramiden- en Leiboomen-vorm zijn aanbevolen.

Men gebruikt voor de Potkulturen ook Abricozen-, Perzik- en Druivensoorten.

**APPELEN.**

- N<sup>o</sup>. 12. Blenheim Pippiu.
- » 15. Calville, Witte winter.
- » 47. Oostindische Compagnie.
- » 50. Pariser Rambour.
- » 52. Peper-appel.
- » 55. Pigeon blanc.
- » 54. » rouge.
- » 56. Pippeling, dubb. Gouden.
- » 57. » Gouden.
- » 59. » Hughes, Gouden.
- » 66. » Wijker.
- » 76. Reinette, Fransche.
- » 106. Cardinal de Juillet.
- » 109. Florianer-Rosenapfel.
- » 119. Pearmain d'Hiver.
- » 121. » Scarlet (Scharlach Parmäne).
- » 125. Pippeling, gele Lavendel.
- » 125. » Ribston.
- » 150. Reinette Ananas.
- » 153. » Muscat.
- » 44. Keizer Alexander. (als sierlijke vrucht).

**PEREN.**

- N<sup>o</sup>. 11. Bergamotte de Pentecote.
- » 15. Beurré Blanc.
- » 19. » d'Arenberg.
- » 20. » d'Hardenpont.
- » 21. » de Luçon.
- » 22. » de Merode.
- » 24. » Diel.
- » 27. » gris d'Automne.
- » 51. Bloodgood.
- » 59. Colmar d'Arenberg.
- » 46. Duchesse d'Angoulême.
- » 56. Napoleon.
- » 57. Passe Colmar.
- » 65. Poire Seigneur.
- » 66. St. Germain (niet als kroontje).
- » 68. Seigneur d'Esperen.
- » 69. Soldat laboureur.
- » 75. Triumphe de Jodoigne.
- » 91. Angleterre.
- » 96. Beurré Coloma (niet als kroontje).
- » 111. Frédéric de Württemberg.
- » 117. Louise bonne d'Avranches.
- » 118. Marie Louise (Duquesne).
- » 121. Osband's Summer.
- » 124. Van Mons (Leon Leclerc).

N<sup>o</sup>. 29. Bezy de Chaumontel. | N<sup>o</sup>. 62. Poire Madame.

Bij het lezen dezer naamlijst van aanbevolen vruchtsoorten rijst de vraag welligt bij deze of gene op: waarom sommige soorten, ook wel aanbevelenswaardig, gemist worden. b. v. bij de Peren de CALEBASSE MUSQUÉE, eene zeer goede soort, die wij echter in 't belang van het algemeen om verschillende redenen (vooral ook om het soortental *niet te groot* te maken), niet raadzaam vonden op te nemen, dewijl daardoor eene andere onzes inziens betere soort moest vervallen; ook geene BEURRÉ CLAIRGEAU, de veel gevraagde Peersoort! deze namen wij niet op, omdat zij onzes inziens *niet tot de voortreffelijkste*, hoewel zeer groote fraaije Peren behoort, welke, hoe schoon en vruchtbaar zij ook zijn moge, toch niet tot den allereersten rang kan gerekend worden; bovendien maakt zij in den regel slechts een' misvormden boom.

Daar wij bij het doen der keuze ook gelet hebben, om voor elk jaargetijde eenige soorten aan te bevelen, welke boven andere meer of minder bekenden in sijnheid en smaak uitmunten, zoo moesten wij met gestrengheid oordeelen.

Elk Planter van vruchtboomen kan zich evenwel naar eigen keus en smaak blijven rigten; wij hebben slechts gemeend door onze aanbeveling zoo mogelijk vereenvoudiging aan te brengen; men beschouwe dus onze lijst van aanbevelingswaardige soorten slechts als eene raadgeving in aller belang.

## E R R A T A.



In de Eerste Reeks „Beschrijving der Vruchtsoorten”  
zijn de volgende drukfouten overgebleven  
men gelieve die te verbeteren.

### IN DE BESCHRIJVING DER APPELEN.

N <sup>o</sup> . 7.	staat: Anales.	... ..	lees: Annales,
„ 8.	„ Anales.	... ..	„ Annales.
„ 10.	„ Decemb.	... ..	„ Decemb. Febr.
„ 14.	„ Maschausken	... ..	„ Maschanke.
„ 16.	„ Hersft.	... ..	„ herfst.
„ 19.	„ Dec.	... ..	„ Decemb. Maart.
„ 22.	„ Madeleine, Rouge Caville.	... ..	„ Madeleine rouge, Calville-rouge
	Rouge d'Été	... ..	d'Été.
„ 25.	„ Hoogst.	... ..	„ Hoogst. Pyr.
„ 26.	„ Sept.	... ..	„ Septemb. October.
„ 27.	„ Fig. 5.	... ..	„ Fig. 5.
„ 29.	„ I T.	... ..	„ I T. I K.
„ 30.	„ Württemberg	... ..	„ Württemberg.
„ 31.	„ Englisch	... ..	„ English.
	appelen (in de opmerk.)	... ..	„ appel.
„ 37.	„ Englisch.	... ..	„ English.
„ 66.	„ 4. (grootte)	... ..	„ 5.
„ 68.	„ Fig. 7.	... ..	„ Fig. 9.
„ 90.	„ Zoete	... ..	„ Zure.
	Ann. de Pom. 14—69.	... ..	„ 4—69.
„ 91.	„ Rouette	... ..	„ Rouelle.
„ 92.	„ Bosdollar.	... ..	„ Bosdollar.

Tabel Appelvormen: onder Fig. 2 staat.

Reine . . . . . „ Reinette.

## IN DE BESCHRIJVING DER PEREN.

Nº. 3.	staat:	(tijd van gebruik).	lees:	October.	Novemb.	—	1 T.
» 4.	»	Kronbirnen . . . . .	»	Kronbirne.			
		1 T. . . . .	»	5 T.			
» 5.	»	3 T. . . . .	»	2 T.			
» 6.	»	Andréinne . . . . .	»	Andréine.			
» 8.	»	3 T. . . . .	»	2 T.			
» 11.	»	Ann. de Pom. 14. . . . .	»	Ann. de Pom. 4.			
» 15.	»	Buerré. . . . .	»	Beurré.			
» 16.	»	C. L. 262. . . . .	»	C. L. 62.			
		Hoogst. . . . .	»	Hoogst. Pyr.			
» 21.	»	Lucon. . . . .	»	Luçon.			
» 22.	»	455 . . . . .	»	455.			
» 27.	»	Hoogst. Pyr. . . . .	»	Pyr. Leib.			
» 54.	»	Journal de L. en . . . . .	»	Journ. de L.			
» 56.	»	Callebasse . . . . .	»	Calebasse.			
		» . . . . .		(zonder » er onder).			
» 40.	»	. . . . .	»	1 T.			
» 53.	»	August Musquée Pean . . . . .	»	August Musquée Pear.			
» 65.	»	Ann. de Pom. . . . .	»	Ann. de Pom. 5—5.			
» 68.	»	de Jonghen . . . . .	»	de Jonghe.			
» 67.	»	Rothbackichte . . . . .	»	Rothbackige.			
» 69.	»	2 T. . . . .	»	5 T.			
» 75.	»	hoge . . . . .	»	hose.			
» 77.	»	Alle vormen. . . . .	»	Hoogst.			
» 88.	»	. . . . .	»	Knoop tab. 2.			
		Rohn . . . . .	»	Rohr.			
» 89.	»	Callebas . . . . .	»	Calebas.			



BESCHRIJVING

DER

**VRUCHTSOORTEN.**

UITGEGEVEN DOOR DE

„VEREENIGING TOT REGELING EN VERBETERING  
DER VRUCHTSOORTEN,”

TE BOSKOOP.

~~~~~  
Derde Reeks. — 1864.  
~~~~~

—◆—  
GRONINGEN,  
J. B. WOLTERS.  
1864.

# APPELSOORTEN.

---

DERDE REEKS.

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOONVORM.	OPMERKINGEN.
151. <b>Beauty of the West.</b> Schöner aus Westland.	C. L. 39. H. B. 4ten Bandes. fol. 37. Oberdieck Anl. fol. 226.	Fig. 5, nadert somtijds zeer Fig. 3, is alzoo zeer verschillend.	1	luchtig groen, zelden een weinig rood, kleine graauw witte stippen, naar den steel een weinig roest.	Novemb. Jan.	3 T. 3 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar.
152. <b>Bedfordshire Foundling.</b> Cambridge pippin. Fündling aus Bedfordshire.  Mignon de Bedford.	C. L. 42.  H. B. 4. fol. 93. Belgie.	Fig. 5, doch hooger, naar den kelk breeder afgerond, waarom eenige verhevenheden.	1	luchtig groen, ligt graauw stippen met witte kringen omreeven, hier en daar roest verspreid.	Novemb. Jan.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Uitermate vruchtbaar.
153. <b>Bess Pool.</b> Best Pool.	C. L. 56.	Fig. 4, meestal iets hooger, om den kelk bevinden zich kleine ribjes welke zich niet over de kelkholte verspreiden.	3	enachtig geel, bijna geheel met bruin rood overtogen en gevlamd, waarin donkerder streepen.	Decemb. Maart.	2 T. 2 K.	Hoogst. Pyram.	
154. <b>Belle fleur, gelber.</b> Belle fleur Yellow.	H. B. 1sten B. fol. 69. C. L. 46.	Fig. 9, naar den kelk iets spitsrond ingebogen toeloopend, ook wel sterk geribd naar den kelk, welke ribben naar den steel zich verliezen, maar zich sterk boven de kelkholte verheffen.	2	oengeel, eenige roest figuren naar den steel, stippen fijn, ligt graauw, zelden een weinig of ligt rood.	Novemb. Febr.	2 T. 2 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar, wordt in Duitschland en in Amerika zeer aanbevolen.
155. <b>Bödikers Wildling.</b> Bödikers Liebling.	H. B. 1. fol. 235. Oberd. Anleit. fol. 142.	Fig. 5, noch al veranderlijk, naar den kelk geribd.	2	oengeel met karmozijn roode streepen, vlammen en vlekjes.	Septemb. Decemb.	1 T. 1 K.	Alle vormen.	Komt ons voor zeer gelijkend te zijn met den Gravensteiner No. 39.
156. <b>Calville Barré.</b>		Fig. 9, minder hoog, nadert somtijds Fig. 5, om den kelk kleiner ribjes, kelk gesloten, met lange terugvallende kelkblaadjes.	3	luchtig groen, zonzijden rood gevlamd, gestreept en gevlekt, weinig verspreide roest.	Novemb. Jan.	2 T.	Hoogst. Pyram.	



NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
157. <b>Calville van Boskoop.</b>	In Boskoop gewonnen. 1863.	Fig. 3, niet altijd zoo sterk geribd, kelk gesloten, steel kort in diepe holte.	nachtig geel met rood veringd, aan de zonzijde geheel rood overtogen, waarin donkere vlammen, dunne roest om den kelk als stof verspreid.	Jan. Maart.	1 T. 1 K.	Alle vormen.	Naar de eerste vruchten te oordeelen, een zeer waardig soort.
158. <b>Calville Fraas' Sommer.</b> Fraas' Weiszer Sommer Calvill.	H. B. 1. fol. 39. Württemberg.	Fig. 8, naar den kelk regelmatig rondtoeloozend, zonder inbuiging, naar den kelk sterk geribd, welke zich boven dezen verheffen.	geel met wit groen veringd, somtijds een weinig rood aan de zonzijden, er en daar kleine groene vlammen en graauwe roestpunten.	Septemb.	2 T.	Hoogst. Pyram.	De boom groeit sterk, en is zeer vruchtbaar.
159. <b>Calville Impériale.</b>	Van de Bavay ontvangen.	Fig. 5, in den regel iets hooger, matige ribben over de geheele vrucht.	geheel met donker purper rood overtogen, aan de schouwzijden schemert een weinig rood door het rood, aan de kelholte een weinig roest.	Decemb. Febr.	2 T.	Pyram.	Is beter als No. 20; zie eerste reeks.
160. <b>Courtpendu Noir.</b> Zwarte Courtpendu.	C. L. 186.	Fig. 1, somtijds iets hooger.	nachtig geel, met purper rood overtogen, waarin donker zwart vlammen en streepen, is er glanzend.	Maart. Mei.	3 K.	Pyram.	Voor den soorten liefhebbers van eenige waarde, fraaije vrucht, doch slechts om te gebruiken.
161. <b>Court of Wick.</b> Fry's Pippin. Golden drop. Knight Wick pippin. Wood's Huntingdon. Philips's Reinette. Wood's New Transparent. Weeks's Pippin. Yellow.	C. L. 187.	Fig. 4, iets hooger.	nachtig geel, somtijds met wit rood carmozijn gevamd, gestreept en overtogen, witte graauwe stippen.	Nov. Maart.	1 T.	Pyram. Lei.	Uitmuntenen soort, in Engeland zeer beëind.
162. <b>Cox Pomona.</b>	Uit Engeland ingevoerd.	Fig. 5, naar den kelk sterk geribd, welke zich boven de kelholte verheffen, open kelk met kleine kelkbladen in diepe holte, steel kort, mede in diepe holte.	geel groen, vol carmozijn rood vlammen, somtijds ook met wit rood overtogen, waar er het geel doorschemerd.	Oct. Nov.	2 T.	Hoogst. Pyram.	
163. <b>Dubbelde Guldeling.</b> Dubbelde Gele Guldeling.	Knoop taf. 12.	Fig. 5, iets meer toeloozend naar den	geel aan de zonzijde met rood als gemarmerd over-	Nov. Dec.	2 K.	Hoogst.	

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
170. Goelijke Roode.		Fig. 9, in den regel naar den steel en kelk iets breeder, meestal ook iets minder lang.	3.	og geel bijna geheel met rood overtoegen waarin donkere vlammen en streepen, buitengewoon fraai uiterlijk.	Septemb. Octob.	3 T. 3 K.	Hoogst.	Is zeer vruchtbaar.
171. Imperiale.		Fig. 5, naar den kelk meerafgerond, rondom den kelk eenige verhevenheden, kelk gesloten.	3.	t geel, aan de zonzijden met a bruin rood overtoegen waarin 4. donkere streepen en vlammen, welke ook aan de schaduwzijden, doch dan ligter rood, te bemerken zijn, roest alleen in de steelholte op te merken.	Jan. Maart.	2 T.	Hoogst.	Eene vruchtbare soort.
172. Maiden's Blush.	C. L. 420.	Fig. 5, doch hooger, naar den kelk breeder afgerond, waarom eenige verhevenheden, de vrucht is aan den eene zijde meestal iets hooger als aan den anderen, kelk gesloten.	1.	elachtig groen, om den kelk met ligt graauwe stippen voorzien, hier en daar sporen van ligt graauwe roest.	Novemb. Jan.	2 T. 1 K.	Hoogst.	Zeer groote vruchtbare soort, wij zagen ze ook elders onder denzelfden naam; wij hebben er nimmer iets roods op gezien, waarvan de C. L. melding maakt.
173. Meloenappel-Amerikaansche. Melon apple, American.	Uit Engeland ingevoerd.	Fig. 5, naar den kelk meer afgerond, en een weinig meer gedrukt, kelk gesloten, eenige verhevenheden vooral om de kelkholtten.	3.	t citroen geel, aan de zonzijde fraai rood gestreept, gevlamd, en ook wel overtoegen, bruin en groenachtige stippen.	Novemb. Jan.	1 T.	Pyram.	Aangename geurig smakende vrucht, moet niet met de Prinsappel worden verward, welke de syn. van Melon appel voert, zie no. 67.
174. Nonpareil-Russet. Rousset Nonpareil.	Oberd. Anl. fol. 223. H. B. 4. fol. 333.	Fig. 4, naar den kelk meer rond toeloopend, kelk half open, met nauwelijks merkbare verhevenheden omgeven.	4.	el, aan de zonzijden goudgeel a net eenig oranje rood als overtoegen, menigvuldige stippen en 3. digte roest hier en daar verspreid.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram. Leib.	Kan zeer aanbevolen worden.
175. Nonpareil White.	C. L. 488.	Fig. 2, naar den kelk minder gespist, kelk gesloten.	4.	enachtig, geheel overdekt met grijsgraauwe roest, aan de zonzijden schemert iets bruin door de roest heen.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram. Leib.	
176. Pearmain, Adams's. Norfolk Pippin.	C. L. 529.	Fig. 7, minder hoog kelk meest gesloten.	4.	enachtig geel, zonzijden met ligt mat rood overtoegen, waar-	Jan. Maart.	1 T.	Alle vormen.	Heeft zeer veel overeenkomst met No. 111.

NAMEN EN SYNONIEMEN :	GENAAMD IN :	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
Adams' Parmäne.	H. B. 4. fol. 153.	ten, om de kelkholte kleine ribjes.		eenige oranjeachtig roode reepjes en vlammen om de steelholte nog al veel roest.				
177. Pearmain Manningston.	Uit Engeland ingevoerd.	Fig. 5, iets hooger en naar den kelk minder afgerond, om den kelk kleine ribjes, kelk half open.	3.	enachtig geel, zonzijden fraai rood overtogen, waarin rode vlammen en streepen, om den kelk eenige roest.	Decemb. Febr.	2 T.	Pyram.	
178. Pearmain, rouge d' Hiver d' Angleterre.	Van Dauvesse, Orleans.	Fig. 9, naar den kelk en steel meer afgeplat en minder afgerond naar den steel, bijna altijd een vleeschuitwas, waardoor de vleeschachtige steel scheef in de vrucht staat.	4.	enachtig geel, aan den zonzijden meer goudgeel, waarin sporen van licht roode vlammetjes, kleine bruin graauwe stippen.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram.	De boom is zeer vruchtbaar, de vrucht is echter wat klein, heeft ook somtijds meer rood.
179. Pippeling, Cox Orange. Cox's Oranje Pippinapple. Pomme Reinette oranje de Cox.	Ann. 7. fol. 11. Uit Engeland ontvangen.	Fig. 5, naar den kelk meer afgerond, kelk gesloten of half open, naar den kelk eenige ongelijke ribben.	4. 3.	1. d, groenachtig geel, aan de zonzijden met licht bruin en rode stippen en vlammen, enig roest aan de steelholte.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram.	
180. Pippeling, Green Ohio's. Green Ohio's Pippin. Reinette von Ohio.	Uit Engeland ingevoerd. Ann. de Pom. 4. fol. 15. H. B. 4. fol. 341.	Fig. 5, doch hooger, naar den kelk breeder afgerond en sterk afgeplat, even zoo naar den steel, om den kelk meestal sterk geribd, welke ribben over de gheele vrucht merkbaar zijn, kelk open.	3.	lchtig groen, aan de zonzijden met licht rood overtogen, waarin eenige vlammen.	Novemb. Febr.	2 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar.
181. Pippeling, Kedlistones. Kedlistones Pippin.	Uit Engeland ingevoerd.	Fig. 7, doch korter dan ook meer afgerond, kelk gesloten.	4.	enachtig geel aan de zonzijden meer goudgeel, waarin kleine rose roode stiptjes, aan de schaduwzijde zijn de stippen groenachtig graauw; eenigen roest hier en daar verspreid.	Decemb. Febr.	1 T.	Pyram. Leib.	

NAMEN EN SYNONIEMEN :	GENAAMD IN :	VORM.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
182. <b>Pippeling, Kentish Roode.</b> Kentish Pippin. Rother Kentischer Pepping.	Anl. Ob. fol 161. H. B. 4. fol. 319.	Fig. 6, naar den steel meer kegelvorming, naar den kelk meer afgerond, kelk wijd open.	2. lachtig groen, zonzijden een einig geelachtig rood, kleine graauwe stippen met donker rood omringd, weinig roest aan den steel.	Dec. Febr.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer schoone vrucht.
183. <b>Pippeling, Kentish Witte.</b> Weiszer Kentischer Pepping.	Anl. Ob. fol. 162.	Fig 5, doch hooger, naar den kelk breed afgerond, kelk in diepe holten door ongelijke verheven- heden omgeven, welke over de ge- heele vrucht zich uitbreiden, kelk gesloten.	2. l. geel, zonzijde bijna goud- achtig, om de kelkholte veel graauwe stippen, waarvan som- migen door roode kringetjes omgeven, weinig roest.	Nov. Jan.	2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer schoone vrucht.
184. <b>Reinette Cantorberry.</b> Reinette von Cantorbury. Pomme de Cantorbéry.	Uit Engeland ingevoerd. H. B. 4. fol. 129. Ann. de Pom. 1 fol. 109.	Fig. 3, veel minder en ongelijker ge- ribd, kelk bijna gesloten.	1. l. witachtig groen, met witte en groene stippen.	Nov. Dec.	1 K.	Pyram.	Zal om de grootte de vrucht minder voor Hoogstamden geschikt zijn.
185. <b>Reinette, Credes Quitten.</b>	H. B. 4. fol. 109. CL. 646. Anl. Ob. fol. 177.	Fig. 5, naar den kelk meer rond toeloo- pend kelk halfopen.	3. l. citroen geel, met fijne en ruine stippen. 4.	Dec.	2 T. 2 K.	Pyram.	Zeer vruchtbaar, op hoogere gronden heeft de vrucht eenen eigen- dommelijken kwee- achtige geur.
186. <b>Reinette d' Angleterre.</b>	Dauvesse. Orleans.	Fig. 5, naar den kelk en naar den steel minder afgerond, vlakke verheven- heden over de ge- heelen vrucht, is in vorm zich niet gelijkblijvend.	2. lachtig geel, zonzijde goud- achtig met flauwen ligt roode vlekken welke ook wel ster- ker voorkomen; hier en daar roenachtige vlekjes, kleine stippen, weinig roest.	Dec. April.	1 T.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar, moet niet met de Pariser Rambour worden ver- wisseld, welke in de CL. ook de syn. van Rei- nette d'Angleterre voert, wat echter onjuist is.
187. <b>Reinette, Elsasser rothe Winter.</b>	Anl. Ob. fol. 179.	Fig. 5, naar den kelk meer spits afge- rond, kleine ribjes om den kelk, kelk gesloten en bijna vlak op de vrucht geplaatst.	3. lachtig groen, met geel ver- mengd, droevig roode vlammen 4. en streepjes over den geheelen vrucht bijna verspreid, weinig en graauwe stippen.	Jan. April.	2 T. 1 K.	Hoogst.	Zeer vruchtbaar.
188. <b>Reinette, Fromm's Gold.</b>	Anl. Ob.	Fig. 5, aan den kelk	4. l. geel, aan de zonzijden een	Jan.	1 T.	Hoogst.	Stamt af van het dorp

NAMEN EN SYNONIEMEN :	GENAAMD IN :	VORM.
Sewer Borsdorfer.	fol. 182.	een weinig meer plat, een weinig scheef, kelk half open.
187. <b>Reinette, Harberts.</b> Harberts Reinette. Harberts reinetterartigen Rambour.	H. B. 4. fol. 163.	Fig. 5, doch iets platter en naar den kelk meer rond toeloo- pend, kelk half open, omgeven van kleine ribben.
190. <b>Reinette Miss Fanny.</b>	Anl. Ob. fol. 145.	Fig. 4, naar den kelk meer rond toeloo- pend, kelk half open, met nau- welijks merkba- ren verhevenheden omgeven, steel meest- al vleeschachtig.
191. <b>Reinette, Sigende.</b> Siegende Reinette. Schilgen's.	Anl. Ob. fol. 204.	Fig. 6, naar den kelk iets breeder afge- rond, kelk half open, steel kort.
192. <b>Reinette, Schmidtbergers rothe Winter.</b> Schmidtbergers rothe winter Reinette	Anl. Ob. fol. 248.	Fig. 5, naar den kelk meer afgerond, kelk wijd open, steel open.
193. <b>Reinette van Ekenstein.</b>	Matth. van Noordt.	Fig. 6, naar den kelk en steel iets bree- der afgerond, om den kelk die open is bijna vlakke ver- hevenheden.
194. <b>Reinette van Mons.</b> Van Mons Reinette. Van Mons Goldreinette.	H. B. 1. 157. Cf. 698.	Fig. 6, ook wel iets platter, de kelk is meest gesloten, in de kelkholten omge- ven door fijne vouwtjes en ribbe- tjes.
195. <b>Seigneur Guldeling.</b>		Fig. 5, naar den kelk iets meer toeloo-

KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEN BOOYVORM.	OPMERKINGEN.
Wenig oranjeachtig overtogen, in den kelk weinig ligt graauwe best.	<i>Maart.</i>		Pyram.	Sewer bij Meiningen.
4-nachtig geel, aan de zonzij- de meer hoog geel, met wei- nig flaauw roode vlammetjes; geelholte met straalvormigen best voorzien; kleine ligt brui- ge stippen.	<i>Nov. Febr.</i>	1 a. 2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar, wordt in Duitschland vooral den landman sterk aan- bevolen.
4, aan de zonzijde goudgeel met eenig oranje-rood als over- togen, menigvuldige stippen, a lichte roest hier en daar verspreid.	<i>Decemb. Febr.</i>	1 T.	Pyram. Leib.	Verschilt in de vrucht zeer weinig van No. 174.
2-geel, bijna geheel met licht oranje-roode vlammen en streepjes a teekend, weinig roest, licht flaauw kleine stippen.	<i>Nov. Jan.</i>	1 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	Zeer vruchtbaar, uit- muntende soort.
3-geel, aan de zonzijde met lanzend rood overtogen, waar- a helder karmozijnroode vlam- men en strepen.	<i>Febr. Maart.</i>	1 a. 2 T. 1 K.	Hoogst. Pyram.	
3-nachtig geel, aan de zonzij- de goudgeel met eenige licht- bode aderen, lichtgeel-bruine bestvlekken hier en daar ver- spreid, steelholte met meer best voorzien.	<i>Oct. Decemb.</i>	1 T.	Hoogst. Pyram.	Afkomstig van het buitengoed Ekenstein, bij Appingedam, in de provincie Groningen.
4-nachtig met geel vermengd, onzijde met goudachtig geel overtogen of gevlekt, dikke best, vooral om den kelk en in den steel, fijne donker- flaauwe stippen.	<i>Decemb. Maart.</i>	1 T.	Alle vor- men.	Wordt in Duitschland vooral voor mostberei- ding sterk aanbevolen en geroemd; in ons klimaat zal deze soort eene goede en warme standplaats behoeven.
3-nachtig droevig geel, aan de onzijde met roode streepjes a vlammen, weinig roest.	<i>Nov. Jan.</i>	2 K.	Hoogst.	Werpt veeltijds de vrucht gedeeltelijk af voor den pluktijd, het

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GEUR.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
		pend, om den kelk matige ribben.						kan zijn, dat dit op zwaren grond minder plaats heeft.
196. <b>Taffetas blanc.</b> Weiszer Taffetapfel. Weiszer winter Taffetapfel. Rostels gelber Weinling.	H. B. 1. 549.	Fig. 4, naar den kelk meer zacht afgerond, kelk half open met kleine ribben omgeven.		4achtig groenachtig licht geel, onzijde met eenig goudgeel velden met een weinig rosé als een bloesje overtogen, bruine stippen aan de zonzijde, overal eens groene stippen.	Dec. Maart.	3 T. 2 K.	Hoogst.	
197. <b>Van Rosande.</b>	Gelderland.	Fig. 5, naar den kelk meer afgerond, om den kelk matige verhevenheden.		2achtig groenachtig geel, somtijds met een weinig rosé aan de onzijde.	Nov. Dec.	2 K.	Hoogst.	Is zeer vruchtbaar.
198. <b>Wijnappel, roode.</b>	Knoop, taf. 8.	Fig. 10, naar den kelk veel breeder afgerond, kelk gesloten, steel kort, meestal scheef gevormd.		2achtig groen, aan de zonzijde met fraai karmozijn rood overtogen, waarin helder donerroode vlammen en strepen; in den boom is de vrucht met een licht blaauwen wasem verdekt.	Nov. Jan.	2 K.	Hoogst.	
199. <b>Wijnappel, witte.</b>		Fig. 10, naar den kelk veel breeder afgerond, meestal heeft de vrucht een op de zijden plat gedrukten vorm.		2achtig geel, aan de zonzijde meer goudgeel, kleine stippen over de geheele vrucht.	Sept. Oct.	2 K.	Hoogst.	
200. <b>Wilkenburger Währapfel.</b>	H. B. 1. fol. 417. Anl. Ob. fol. 245.	Fig. 5, somtijds iets hooger, meestal ook scheef, ook wel eens meer afgerond naar den kelk; kelk half of geheel open, kleine verhevenheden over de vrucht.		4achtig geel, bijna geheel overtogen met glanzend rood, waarin donker karmozijn roode aderen en korte vlammen.	Febr. April.	2 T. 1 K.	Hoogst.	Buitengewoon fraaije vrucht, en milddragend.
201. <b>Weiszer Sommer-Taubenapfel.</b>	H. B. 1. fol. 445.	Fig. 7, in den regel iets korter, kelk gesloten en groenblijvend, welke bijna vlakke verhevenheden om de kelkholte, tot op de helft der vrucht te zien zijn.		4achtig geel naar kelk en steel met eenig groen vermengd, zeer weinig kleine bruine stippen, in de kelkholte een weinig roen graauwe roest.	Sept.	1 T.	Pyram.	Voor eenen zomerappel aangenaam van smaak.

**PEERSOORTEN.**

---

**DERDE REEKS.**

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
128. Ananas de Courtrai.	Ann. de Pom. 2 fol. 13.	Fig. 11, naar den kelk fraai afgerond, ook wel iets korter, zeer bultig.	3.	enachtig geel, aan de zonzijde met fraai rood vlamachtig overtoegen, ligte graauwe roest en stippen over de geheele rucht verspreid.	Sept.	1 T.	Pyram.	Herinnert in den smaak aan den Bon-chretien William, is niet zoo sterk gemuskeerd, vruchtbaar.
129. Bonne de Ezée. Belle et Bonne d' Ezée. Bonne des Zées. Die Gute von Ezée. Belle et Bonne de Haies.	Aun. de Pom. 5 fol. 73. Journ. de Lyon. H. B. 1. fol. 423.	Fig. 11, naar den kelk meer afgerond, naar den steel meestal eenzijdig ingebogen.	2.	lachtig groen, met bruinraauwe roestvlekken en stippen, om den kelk en steel met graauwen roest meer bedekt.	Sept. Oct.	2 T.	Pyram.	Jammer dat deze fraaije vruchtbare soort zeer flauw van smaak is.
130. Bergamotte d' Esperen. Bergamotte Esperen. Esperens Bergamotte.	Aun. de Pom. 5—75. H. B. 5. fol. 181.	Fig. 2, naar den kelk meer ingebogen afgerond, naar den steel ook meer spits afgerond.	4.	lgroen, met eenig geel gemengd, bruine stippen en roestvlekken.	Decemb. Maart.	1 T.	Leib.	Is in Nederland alleen als leiboom aan te bevelen, op zeer warme standplaats kan de pyramidenvorm dienen, is zeer vruchtbaar.
131. Beurré d' Albret. Beurré Dalbret. Butterbirne von Albret.	H. B. 1. fol. 433.	Fig. 11, naar den kelk iets meer afgerond, naar den steel welke meestal scheef in de vrucht is geplaatst eenigzins eenzijdig ingebogen.	3.	al, aan de zonzijde met bruinrood overtoegen, veel licht bruine roest.	Sept. Oct.	1 a. 2 T.	Pyram.	Niet op kwee te veredelen.
132. Beurré de Koning (van Mons). Konnings Butterbirne.	H. B. 5. fol. 79.	Fig. 6, naar den kelk meer afgerond, naar den steel iets ingebogen en meer toeloopend.	3.	veilig groenachtig geel, later meer lichtgeel, met groote bruine stippen, en om den kelk en steel met eenigen roest.	Sept. Oct.	3 T.	Pyram.	Is flauw van smaak.
133. Beurré Duval.	Ann. de Pom. 5. fol. 49.	Fig. 11, naar den kelk en steel meer rond toeloopend, kelk open.	3.	na witachtig geel, aan de zonzijde met fraaije roode strepen en vlammen, lichtbruine stippen.	Oct.	2 T.	Pyram.	Zeer fraai en vruchtbaar, doch flauw.
134. Beurré le Fèvre, (le Fèvre). Beurré de Mortefontaine.	Bavay.	Fig. 3, naar den steel welke somtijds met een vleeschuitwas is voorzien, eenigzins ronder toeloopend.	3.	el, bijna geheel bedekt met donkerbruine roest, aan de zonzijde met donkerbruin rood gemengd, wit-grauwe stippen.	Sept. Oct.	2 T.	Pyram.	Wordt spoedig beurs.



NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
135. <b>Beurré Nantes.</b> Beurré de Nantes.	Ann. de Pom. 2 fol. 17. Journal de Lyon.	Fig. 11, naar den kelk meer afgerond, naar den steel meestal eenzijdig ingebogen.	3.	at groenachtig, bijna wit, zon- zijde met fraai licht roode lammen en strepen, kleine ruine stippen, om den steel enige roest.	Septemb. Octob.	2 T.	Pyram.	Is zeer saprijk, maar flaauw.
136. <b>Beurré Sterckmans, (Sterckmans).</b> Belle alliance. Doyenné Sterckmans.	Ann. de Pom. 4 fol. 51. Bavay Papeleu.	Fig. 8, naar den kelk niet ingebogen, wel rond toeloo- pend, ook naar den steel weinig ingebogen.	3.	evig geel, aan de zonzijde a met bruin rood overtogen, re- 4. elmatige bruine stippen, eenige roest om kelk en steel.	Oct. Decemb.	1 T.	Pyram. Leib.	
137. <b>Beurré Six, (Six).</b>	Ann. de Pom. 5 fol. 7.	Fig. 9, naar den kelk meer afgerond, naar den steel meestal sterk ingebogen, nog al bultig.	1.	luchtig groen, met graauwe tuppen en roestfiguren.	Novemb. Decemb.	2 T.	Pyram. Leib.	
138. <b>Beurré Winter.</b>	Van Rivers in Engeland.	Fig. 9, naar den kelk minder ingebogen, om den kelk ge- ribd, naar den steel eenzijdig ingebo- gen, de steel staat daardoor scheef in de vrucht.	3.	oenachtig geel met veel graauwe stippen en samenhangenden roest hier en daar bedekt.	Novemb. Decemb.	2 T.	Pyram.	
139. <b>Catinka, (Esperen).</b>	H. B. 5. fol. 123.	Fig. 9, naar den kelk afgerond, niet ingebogen, naar den steel eenzijdig ingebogen, de steel nog al lang, kelk open.	3.	luchtig groen, vol groote a graauwbruine stippen, met roest 4. oorral om den kelk.	Oct.	3 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar.
140. <b>Castelline, (la).</b> Castelline.	Papeleu.	Fig. 3, naar den steel met eene kleine in- buiging, en meer afgerond toeloo- pend, kelk zeer klein, kelkbladeren ontbreken meestal.	4.	el, bijna geheel met kaneel- kleurigen roest bedekt, aan de zonzijde somtijds bruin rood overtogen.	Oct. Novemb.	2 a. 3 T.	Pyram.	De smaak dezer vrucht is aangenaam, het vleesch is echter te vast voor eene tafelpaar van hoo- geren rang.
141. <b>Charlotte de Brouwer, (Esperen).</b> Charlotte von Brouwer.	Ann. de Pom. 3 fol. 33. H. B. 5. fol 113.	Fig. 3, naar den steel ook wel eens inge- bogen, naar den kelk een weinig meer afgerond.	3.	oenachtig geel, ook wel geel- a achtig groen met bruingraau- 4. we stippen en roestfiguren.	Oct. Novemb.	1 a. 2 T.	Pyram.	Wordt in België ook voor boomgaarden aan- bevolen.

NAMEN EN SYNONIEMEN :	GENAAMD IN :	VORM.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
142. <b>Conseiller Ranvez (van Mons).</b>	Bavay. Journ. de Lyon.	Fig. 3, doch veel langer en naar den kelk meer afgerond, kelk meestal gesloten	1. lachtig groen, vol groote graauwe stippen, om den steel in kelk met dikken roest belect.	Sept. Oct.	3 T. 2 K.	Pyram.	Groote vrucht en zeer vruchtbaar, kon wel een vergeten soort worden, ze is slecht.
143. <b>Doyenné de Juillet (van Mons).</b>  Doyenne d' Été. Saint Michel d' Eté. Juliusdechantsbirne.  Roi Jolimont.	Ann. de Pom. fol. 57.  H. B. 1. fol. 375. Journ. de Lyon.	Fig. 2, naar den steel en den kelk een weinig ronder.	4. enachtig geel, met fraai, lezendig karmozijnrood overtogen, geelgraauwe stippen.	Julij. Aug.	3 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar, eene der fraaiste zomerperen.
144. <b>Esperine (van Mons).</b> Poire Esperine. Die Esperine.	Ann. de Pom. 4. fol. 73. H. B. 1. fol. 481.	Fig. 11, naar den kelk meer afgerond, naar den steel zeer weinig, veelal eenzijdig ingebogen, kelk hoornachtig, open, steel meestal met eenig vleesch bij de vrucht voorzien.	3. ht groenachtig geel, aan de zonzijde meer goudgeel, met licht menienrood als gevlekt, hier en daar stippen en dunnen verspreiden roest.	Oct.	1 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar, op kwee niet aan te bevelen, groeit daarvoor te teeder.
145. <b>Fondante des Bois.</b> Belle des Bois. Poire des Bois. (Bosch Peer). Beurré des Bois. Beurré de Deftinge. Poire de Persil. Belle de Flandre. Davy. Flemish Beauty. Bouche Nouvelle. Brilliant. Holzfarbige Butterbirne. Fondante de Paris. Beurré Spencé. Léon Juleré. Beurré de Bourgogne. Beurré d' Amour. Nouvelle gagnée á Heuze. Beurré d' Elberg. Beurré Foidart.	Ann. de Pom. 6. fol. 41. Journ. de Lyon.  CL. No. 228.  H. B. 1. fol. 39.	Fig. 7, naar den steel een weinig ingebogen en ook meer toeloozend, naar den kelk een weinig afgerond, kelk open.	2. cht geelachtig groen, aan de zonzijde somtijds met fraai donker rood overtogen, groote graauwe stippen, en zeer veel dunnen overal verspreiden roest.	Oct.	1 T.	Alle vormen.	Voortreffelijke soort, als hoogstamde verlangt ze eene beschutte standplaats, heeft veel overeenkomst met de Peer Ida (Müller), in Züllichau gewonnen.

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
<p>146. <b>Grand Soleil (Esperen).</b> Poire Grand Soleil.</p> <p>Die Sonnenbirne.</p> <p>Grand Soleil (van Mons).</p>	<p>Ann. de Pom. 7. fol. 93. H. B. 5. fol. 131. Journ. de Lyon.</p>	<p>Fig. 6, doch korter, naar den steel meer afgerond, naar den kelk veel meer afgerond, kelk open, in matige holte.</p>	3.	adgeel, bijna geheel met dunnen kaneelkleurigen roest overlekt, somtijds eenige sporen van rood.	Nov. Decemb.	1 T.	Pyram.	Op beschutte standplaats ook voor den hoogstamden vorm aanbevelen, moet niet op kwee worden veredeld.
<p>147. <b>Louis Bosc.</b></p>	<p>Bavay.</p>	<p>Fig. 2, naar den steel meer afgerond toeloopend, naar den kelk ook meer afgerond, somtijds naar den steel eenzijdig ingebogen, kelk half open, of gesloten.</p>	4.	eenachtig geel, aan de zonzijde met bruinrood een weinig overtogen en gevlamd, dunne licht graauwe roest hier en daar verspreid.	Oct.	1 T.	Pyram.	Vruchtbaar.
<p>148. <b>Madame Elisa (Bivort).</b> Poire Madame Elisa.</p>	<p>Ann. de Pom. 4 fol. 31.</p>	<p>Fig. 11, naar den steel spits ingebogen toeloopend, naar den kelk fraai afgerond, kelk wijd open.</p>	3.	na wit, met iets groenachtigs vermengd, zonzijde geelachtig met eenig rood vermengd.	Oct.	2 a. 1 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar.
<p>149. <b>Marasquine (Esperen).</b></p>	<p>Van de Bavay ontvangen.</p>	<p>Fig. 2, naar den steel meer spits afgerond, evenzoo naar den kelk, kelk gesloten, met kleine ribben omgeven.</p>	4.	elachtig groen, met veel graauwen roest, en groote graauwe stippen.	Oct. Nov.	2 T.	Pyram.	
<p>150. <b>Nee plus Meuris (van Mons).</b> Beurré d' Anjou. Ne plus Meuris. Die Winter Meuris (van Mons).</p>	<p>Ann. de Pom. 7 fol. 47. Journ. de Lyon. C. L. 326. H. B. 1. fol. 359.</p>	<p>Fig. 11, naar den steel een weinig ingebogen toegespitst, naar den kelk meer afgerond, kelk klein, open; de steel met een weinig vleesch voorzien.</p>	3.	roenachtig geel, aan de zonzijde eenig dof rood, fijne bruine stippen en hier en daar eenige roest.	Nov. Decemb.	1 T.	Pyram en Leib.	Uitmuntende soort.
<p>151. <b>Paul Thielens (van Mons).</b> Paul Thiellens.</p>	<p>Papeleu.</p>	<p>Fig. 11, naar den steel nog al spits afgerond, naar den kelk meer regelmatig rond toeloopend, kelk klein, half open.</p>	2.	roenachtig geel, aan de zonzijde met licht rood een weinig overtogen, waarin eenige strepen en vlammen, weinig roest.	Oct.	2 T.	Pyram.	Fraaije vrucht, doch niet van de voortreffelijkste van smaak.

NAMEN EN SYNONIEMEN :	GENAAMD IN :	FORM.	SOORT.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
152. <b>Princesse Charlotte (Esperen).</b> Die Prinzessin von Oraniën? Prinzessin Charlotte.	H. B. 1. fol. 411.	Fig. 2, naar den steel meer spits-rond toeloopend, somtijds een weinig ingebogen, kelk open of half open.	4.	geelachtig groen, met fijne geelbruine stippen, en dunnen roest om den steel.	Oct.	2 T.	Pyram.	Bij Baltet, „Auswahl wehrtvoller Birnsorten,“ wordt deze soort als één met de Prinzessin von Oranien aangegeven.
153. <b>Roi Louis nouveau.</b> Beurré de Bollwiller.	Dauvesse. Le Roy a. Angers.	Fig. 11, naar den steel een weinig eenzijdig ingebogen, naar den kelk iets meer afgerond, kelk half open.	3.	licht geelachtig groen, een weinig rood, somtijds aan de zonzijde bruine stippen en met roest overtogen.	Oct. Decemb.	2 T.	Pyram.	Niet op kwee te veredelen.
154. <b>Rousselet van der Weken, (Grégoire).</b> Rousselet van der Veken. Rousselet van der Wecken.	Ann. de Pom. 3 fol. 41.	Fig 2, naar den steel meer spits afgerond, kelk half open.	4.	lichtgeel, aan de zonzijde met eenig rood overtogen en gevlamd, kleine bruine stippen, eenig roest om den steel.	Nov. Decemb.	2 T.	Pyram.	Zeer vruchtbaar, de vrucht is evenwel te klein, om in den eersten rang plaats te bekleeden; er zijn betere soorten in dit jaargetijde.
155. <b>Schmalzbirne von Brest.</b> Fondante de Brest.	H. B. 5. fol. 51.	Fig. 11, doch veel korter, naar den steel spits afgerond, naar den kelk regelmatig afgerond, kelk open, steel nog al lang.	4.	geelachtig groen, bijna geheel met donkerrood overtogen, waarin vele fraaije karmozijnroode vlammen. In 't groen bevinden zich grauwe, in het rood witgrauwe stippen.	Aug.	2 a. 3 T.	Pyram.	Moet niet met de oude Fransche kaneelpeer worden verward, die ook de synoniem voert van Fondante de Brest, en lang zoo goed niet is.
156. <b>Simon Bouvier nouveau.</b> Die neue Bouvier.	H. B. 5. fol. 169.	Fig. 11, naar den steel een weinig eenzijdig ingebogen, afgerond, naar den kelk regelmatig afgerond, bij den steel meestal met een weinig vleesch voorzien als een uitwas.	3.	naanzienlijk geelachtig groen, met groote grauwe stippen, aan de zonzijde met zeer dikken bruin grauwen roest als overdekt, hierdoor is de vrucht zeer ruw op 't gevoel.	Febr. April.	2 a. 3 T.	Pyram. Leib.	In ons klimaat zal de vrucht aan leiboom op zeer warme standplaats misschien iets beter worden dan wij ze tot hertoe bevonden, zoo niet, dan past ze voor Nederland niet.
157. <b>Saint André.</b>	Le Roy Angers.	Fig. 3, doch naar den steel zeer weinig ingebogen en spitsachtig afgerond, naar den kelk fraai rond, kelk open.	3.	groenachtig geel, bijna witachtig geel, met een weinig licht rood bijna rosé als overtogen, weinig zeer dunnen roest, en kleine grauwe stippen.	Sept. Oct.	2 a. 1 T.	Pyram.	

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
158. <b>Saint Michel Archange.</b> Erzengel Michael.  Saint Michel Archange.	H. B. 5. fol. 121. C. L. 382. Journ. de Lyon.	Fig. 9, doch naar den steel meer spits met eene kleine inbuiging toeloozend, naar den kelk regelmatig afgerond, deze half open.	3. Eenachtig licht geel, aan de zonzijde meer hoog geel, bruin graauwe stippen, en hier en daar eenige roest.	Oct.	1 T.	Pyram en Leib.	Zeer goede vrucht, niet op kwee te veredelen.
159. <b>Vauquelin.</b> Saint Germain. Vauquelin.	Ann. de Pom. 1 fol. 104.	Fig. 9, naar den steel meer spits, een weinig ingebogen toeloozend, naar den kelk een weinig ingebogen afgerond.	3. aanzienlijk geelachtig groen, aan de zonzijde een weinig bruinrood, graauwe stippen, hier en daar eenige roest.	Dec. Febr.	2 T.	Leib.	Op eene warme standplaats kan deze vrucht in den eersten rang opgenomen worden, niet op kwee te veredelen.
160. <b>Zephirin Grégoire (Grégoire).</b> Zépherins Butterbirne.	Ann. de Pom. 3 fol. 79. H. B. fol. 343. Journal de Lyon.	Fig. 2, een weinig hooger, de afgebeelde vrucht in 't handboek met a geteekend, is een meer afwijkende vorm.	4. elachtig groen, aan de zonzijde somtijds eenig licht bruin rood, bruine stippen en eenige roest hier en daar.	Nov. Febr.	1 T.	Pyram en Leib.	De vrucht is niet groot, doch zeer goed, niet op kwee te veredelen.

# KERSSOORTEN.

---

DERDE REEKS.

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.	GROORTE.	KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WELKEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
29. Belle de Ribeaucourt.	Papeleu. Ontvangen van Bavay te Vilvorden.	No. 2, iets hooger, stempelpuntje een weinig ingedrukt.		2. Verschijnend bruin rood, schaduwzijde iets bleeker.	2 Per.	2de.	Hoogst. Pyram.	Zacht vleesch, 't sap gekleurd, zeer goede kers, gelijk zeer naar de Meikers.
30. Büttners gelbe Knorpel.	Anl. Ob. fol. 511.	No. 5, stempelpuntje iets ingedrukt, fraai regelmatig gevormd.		2. Fraai geel, zonzijde donkerder geel, zonder eenig rood.	2 Per.	2de.	Hoogst.	Vast vleesch, niet volkomen knapkers; sap helder, is zeer zoet en aangenaam, als een zeer duidelijk kenteeken kunnen dienen, de ligt gele kliertjes op de bladstelen, welke zóó bij geene der kerssoorten voorkomen.
31. Coë's Transparent.		No. 5, bijna rond, eenigzins scheef naar het stempelpuntje, steel matig.		2. Glanzend geel wit, bijna geheel overdekt met roode vlekjes en aderen, als gemarmerd, bij volle rijpheid is van het geel bijna niets te zien, de huid is zeer dun.	2 Per.	1ste.	Hoogst. Pyram.	Zacht vleesch, 't sap bijna ongekleurd, zoet, niet waterig, uitmuntende soort.
32. Dönissens gelbe Knorpel.	H. B. 3. 145.	No. 5, stempelpuntje iets ingedrukt, zeer regelmatig, steel matig.		2. Fraai geel, zonzijde hoog geel.	2 Per.	1ste.	Hoogst.	Vast vleesch, niet knapkersachtig, sap helder, zeer zoet en aangenaam, deze is beter dan No. 30. De vruchten gelijken zeer naar elkander.
33. Krügers Herz Kirsche. Krügers Schwarze Herz Kirsche.	H. B. 3, 67.	No. 5, komt ook wel eens nabij No. 4, de punt is echter altijd stomp, steel matig.		2. Zwartachtig.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht vleesch, sap donkerrood, zoet, wijnsachtig, voortreffelijk kers.
34. Late Duke. Anglaise tardive.	C. L. 31.	No. 2, iets hooger, stempelpuntje scheef, ingedrukt, steel nog al lang, een weinig gebogen.		2. Geelachtig, met donker glanzend rood; aan de schaduwzijde het rood eenigzins gesprekeld over 't geel, in 't rood somtijds ook donkerder roode vlekjes.	3 Per.	2de.	Hoogst. Pyram.	Zacht vleesch, sap helder, zoet, door weinig rinsch gematigd, fraaije kers, tot in de gustus te gebruiken.
35. Rothe Muscateller.	H. B. 5. fol. 159.	No. 2, het stempelpuntje iets ingedrukt, matige steel.		2. Glanzend donker bruin rood, in de naad iets ligter gekleurd.	2 Per.	1 a. 2.	Hoogst.	Zacht vleesch, 't sap iets gekleurd, geëten in de vrucht naar Meikers, doch is gro

NAMEN EN SYNONIEMEN:	GENAAMD IN:	VORM.
36. <b>Rothe Oranien Kirsche.</b> Holländische Kirsche. Fleischfarbige. Carnation. Altendorfer. Grosze Spanische Gewürzte. Weisze Malvasier. Carnation.	H. B. 3. fol. 175.  C. L. 26.	No. 2, iets platter, stempelpuntje inge- drukt, steel lang.
37. <b>Schwarze Spanische Knorpel.</b>	H. B. 3. fol. 87.	No. 5, naar het stem- pelpuntje stomp af- gerond, steel matig.
38. <b>Späte Maulbeer Kirsche.</b> Späte Maulbeerherz. La Guigne mure de Paris.	H. B. 3—75.	No. 5, het stempel- puntje iets inge- drukt, steel lang, steen klein.
39. <b>Tartarian White.</b> Fraser's White Tartarian. Fraser's White Transparent. Ambrée a Petit fruit.	C. L. 73.	No. 2, iets scheef gevormd, klein stempelpuntje, steel lang, staat als bo- ven op den vrucht.
40. <b>The Herald.</b>	Te Born gevonden in Overijssel.	No. 5, stempelpunt ingedrukt, steel matig lang, gebogen, staat in eene matig diepe holte.

KLEUR.	TIJD VAN GEBRUIK.	RANG.	VOOR WEL- KEN BOOMVORM.	OPMERKINGEN.
2. Voorschijnend glanzend licht rood, bij volle rijpheid iets donkerder.	3 Per.	2de.	Hoogst. Pyram.	Zacht saprijk, helder sap, zoet met iets rinsch vermengd, moet niet met No. 7 verwisseld worden, welke ook Oranjekers heet.
2. Jonkerbruin rood, bijna zwart.	2 Per.	1ste.	Alle vormen.	Zacht vleesch, 't sap is zeer donker gekleurd, is zeer zoet van smaak.
3. Zeer zwart, glanst niet sterk.	3 Per.	2de.	Alle vormen.	Zacht vleesch, 't sap donker gekleurd, smaak zoetachtig rinsch, de vrucht is nog al teêr.
3. Doorschijnend, bijna wit, zon- zijde een rose blosje.	2 Per.	1ste.	Hoogst. Pyram.	Zacht saprijk, onge- kleurd, rinsch, zeer aan- genaam, het weefsel der vrucht is door de huid zichtbaar.
1. Geelachtig rosé, aan de zonzij- den bruin rood, schaduwzijde marmerechtigt rood en geel.	2 Per.	2de.	Hoogst.	Vast vleesch, 't sap is niet gekleurd, zoet van smaak, de steen is zeer groot, anders ware het een kers van den eersten rang, gelijkt in de vrucht veel naar No. 11, is echter niet zoo goed.



## K.J.W. OTTOLANDER

### Biografische schets met portret

De kwekerij van de familie Ottolander in Boskoop werd al gesticht aan het eind van 18de eeuw, en door de grootvader van onze vriend in de moeilijke jaren tussen 1795 en 1813 zo goed mogelijk overeind gehouden .

De zaak werd in latere jaren flink uitgebreid, toen de gebroeders Cornelius, J.W. en P.A. onder de naam Firma J. Ottolander en Zonen de leiding van de kwekerij op zich genomen hadden.

De oudste broer, Cornelius, was een deugdelijke onderzoeker en een ervaren pomoloog, daarover zijn de oude handelsvrienden in Nederland het wel eens.

De firma werd in goed onderling overleg in 1845 opgeheven . Cornelius Ottolander, de oudste e zijn oopvolger C.G. Overeinden, de zoon van een dochter Ottolander, heeft de firma Corn. Ottolander & Zoon overgenomen.

P.A. Ottolander, en na diens dood zijn zonen E.J.W., J.W. en F.G.H. Ottolander zijn druk met de handel in bomen en houden er uitgebreide kwekerijen op na. Een neef neem het deel van broer J.W. over en handelt sinds 1845 voor eigen rekening onder de naam Ottolander en Hooftman. Evenals als de rest van de familie houdt hij er een grote kwekerij op na.

De hele familie is op eigen manier bezig met de boomkwekerij.

Onze K.J.W. Ottolander werd geboren op 13 november 1822 geboren, en kwam na zijn studie bij zijn oom in diens kwekerij aan het werk. Deze oom heeft hem ingewerkt in het kwekerij gebeuren. In 1844 kwam hij tijdens een zakenreis in contact de heer L. de Bavay in Vilvoorde, met A.Papeleu in Wetteren en bracht van die nu bekende boomkwekers en anderen zoals Van Mons en Majoor Esperen door hun gekweekte nieuwe soorten mee. Door zijn contacten in vooral Engeland en Frankrijk maakte hij kennis met de vele nieuwe fruitrassen in die landen, wat blijkt uit een groeiende kennis, opgeslagen in notities en afbeeldingen.

Het ging Ottolander er niet zozeer om grote collecties samen te stellen, maar vooral om door grondige beproeving van de rassen vast te stellen welke rassen goed konden worden bevonden en welke, door gebrek aan kwaliteit, uit de collecties moesten worden genomen. Zo wilde hij tot een kleiner aantal rassen komen en zo de keus van de rassen voor kweker en afnemer gemakkelijker te maken.

Tegenwoordig omvat de Ottolander Kwekerij 30 abrikozen, 300 appels (er werden minstens 3 tot 400 rassen weggedaan wegens gebrek aan kwaliteit), 40 wijndruiven, 80 kersensoorten, 325 peren (nog steeds veel te veel), 70 nectarines en perziken, 30 pruimen, en verder nog vele aardbei- en bessen soorten, enz.

Hij heeft ieder jaar een flinke hoeveelheid leibomen beschikbaar, ongeveer 4000 tot 4200 stuks, in uiteenlopende vormen, echter niet ouder als 3 - 4 jaar, mooie pyramides en sterke hoogstammen.

Dit alles is bij zijn familie in Boskoop in cultuur en verder zijn er nog meer kwekers actief in de omgeving. Ottolander zegt zelf, dat er zo'n 2500 inwoners hun welstand te danken hebben aan de boom- en planten-kwekerij.

De laatste grote fruit-tentoonstelling van de Boskoopse Pomologen vereniging telde 443 rassen appels en peren, meestal geïmporteerde rassen. Daarvan toonde de tentoonstelling 160 appel-en 70 perensoorten afkomstig van Ottolander - een fraaie collectie waarvoor het eerst dat jaar vruchten werden geoogst.

Ottolander heeft ook een groot aandeel in het samenstellen van het werk "Beschrijving der Vruchtsoorten 1, 2 en 3", uitgegeven door de genoemde Pomologische Vereniging. Van wezenlijk belang was zijn medewerking aan "De Nederlandse Boomgaard" waarvoor hij talloze bijdragen schreef. Ook schreef hij artikelen voor het tijdschrift "Pomona", was actief in het Landbouw Convent en gaf een brochure uit waarin voor de leek "de beste vruchten" werden beschreven.

Zijn pomologisch vakmanschap als lid en bibliothecaris van de Pomologische Vereniging had zich als doel gesteld, samen met zijn collega's te werken aan : Vergroting van de Pomologische wetenschap en het succes van de Boskoopse kwekerijen.

Dr Ed. L.